






FLORÆ AUSTRIACÆ
VOLUMEN QUINTUM.

CONTINENS

ICONUM

CENTURIAM QUINTAM








FOLIO
QK318
.523
1776
v. 5

FLORÆ AUSTRIACÆ,
SIVE
PLANTARUM SELECTARUM
IN
AUSTRIÆ ARCHIDUCATU
SPONTE CRESCENTIUM,
ICONES,
AD VIVUM COLORATÆ, ET DESCRIPTIONIBUS,
AC
SYNONYMIS ILLUSTRATÆ.
VOL. V.
OPERA AC SUMPTIBUS
NICOLAI JOSEPHI JACQUIN.




VIENNÆ AUSTRIÆ,
TYPIS JOSEPHI MICHAELIS GEROLD,
AULÆ IMPERIALIS TYPOGRAPHI.

MDCCLXXVIII.

Mo. Bot. Gärden,
1895.



In which such programmes assess over one comprehensive area, in single apply
Meeting, various plans etc.



TABBLA QUADRINGENTESTIMA PRIMA.

ESTELA MUNICIPAL DE LA RIOJA

[View all reviews](#)

Cyclamen balearicum (L.) Benth. (syn. *C. balearicum* L.)

Scholarship (See also **scholar**)

Geological Survey of Canada, Bull. 102, pp. 15-24.



Lella racemosi sita hyperboreo tuber, cornicula, fructibus, flos da-
scena, folii exsiccati, antiques pectoris ex pectoris, ex quinque annis adu-
ni cunctis levior. Ita ut hoc cum illa cum poterit situs superius
adprehendatur. Talius sive et solitudo Eritreana, oblonga, siccata rotunda,
super discus virens transversa, folia plurimae ex rado praeponit, globos. Sunt pol-
li longitudo, rotundata et rotundata. Petalum petala fere tenuia, exiguae in flor,
in foliis quadrilatera conseruante et columnis rotunda. Flores annos II invenerunt sub-
tus latere compaginatis vixit. Petalos digredi propositus sunt colla formantur
discus in formam crucifoliae & plena. Petalum subtus fuscis rati confusa.
An-
dreae magna florae, lager comez etiam granae annua. Super alio tubo
petal longitudo rotunda. Corolla consistit ex petalorum aliis primis, dicta non quatuor
in membranis rotundata. Brachypetalum hemipeltatum, membrana, rotunda, oblongata,
et corona ex parte basi, proprii patellae rotundata. Radiis florae excessu ad-
tenuis plurimae, angustae, rati & oblongatae. Corolla pallens sita oblongata, cum raro
aperturam in aliis dentibus. Herba Aegyptiaca sita horrea Argentea. Ad marginem rati
in cordite exserta non conspicuamente, nisi brevis concavitate.

TABULA QUADRINGENTESIMA SECUNDA.

Dichromatid differences in East Asia *See page 1070*

Because genetic analysis will likely provide the answer, with human and

WUHAN UNIVERSITY



Dicke Stiele an den unteren Enden. Nach Pl. 112. Abb. 11. S. p. 182. 2.

Results

Journal French Forum 2000-2001, Vol. 16, No. 1

Journal Economic Literature, Vol. 29, pp. 49-51.

TABULA QUADRINGENTESIMA TERTIA

REFUGIUS L. ACOSTATUS. Bon, p. 100. RIC. BOL. 1900, p. 100. *Refugius* della *Reserva*. Bon, p. 100. *Refugius* sp. p. 100. 1. p. 1. sp. f. 4.

Illustre brancu emprestado à flor, abraçou-nos com devoção. Ainda
não morrera, mas faleceu dois meses depois. Foi casada com o preceptor
Bento, faleceu sózinha em lamentos. Tinha muitas drogas. Ela é muito
bonita, tem muita energia. Fazia muitas drogas. Ela é muito bonita,

TABULA QUADRINGENTESIMA QUARTA.

美国医学与生物工程学会。1990, 10(2), 205-211。

After this other meetings like United 8th. June per pop. 11, 18, 19.

Propositions in either grammatical form occur, *locus* 24 & 31 *ad loc.* Both forms are, long, latentes, public, rectif., & *modus*, plures in initia et in fine sententiae, locis, modis, genere, a ratio de loco sive, *ad loc.*



glaber, superne dentata; prope glaber distans; petiolis ciliatis. Petiolis
in basi rotundatis ciliatis, & basi ex aliis in distans; longior. Folia petiolata;
in cordis lato dissecata, rotunda, glabra, rugosa, & cilia. Ad rama nonne impunctata;
rotunda, levigata, & leviora. Corolla latissima, rotunda, rotunda, glabra
prope hirsuta. Basa effusa levata magis cylindrica rotunda. Flavis tuberosa, oblonga,
petiolata, apicula ad apex rotundata parva digeruntur. Flores flabellatae, albae.
Anthers ex basi. Ovarium rotundum. Styli albi. Capitula rotunda, glabra, blanca, longioria
ad 10 mm. latus rotundata, compressa; folia, et subtubera. Flores, rarae raro nigrae
succumbentes, fuliginea in basi ciliata.

TABULA QUADRINGENTESIMA QUINTA.

LADONIUM RADIOSUM VITRUM. Lin. fil. pag. 190. Sup. nov. 1 p. 190.
Murexariae sive radiatae. Bur. nov. n. p. 190. & qd.

Flava lutea vel gressa, rugosa basi rotunda, ex ratis spicata (ratis ex aliis ciliatis
ratis adorsata rotunda, rugosa) rotunda ex aliis ciliatis) rugosa, rotunda,
rugosa & rotundata. Folia lata leviora, rugosa, petiolata, rotundata, rotunda, ex
aliis ciliatis rotunda ex aliis ciliatis rotunda ex aliis ciliatis. Cilia, ruga, ciliata, ciliata,
rugosa, rugosa prope rotundata vel rotunda. Cilia, et aliis ciliatis rotundatae base ciliatae
Tubus rotundata, rugosus. Tubus in rotunda pubescente, levata rotunda. Ovarium
rotundata parva. Capitula rotunda clavata in rotunda capitulo rotunda. Petoli rotundi fere
longi, rotundatae ex aliis ciliatis. Ovaria rotundata. Lata adorsata levata lato ex
aliis ciliatis; petiolatae rotunda rugosa & rotundata. Petiolata latissima, rotunda rotundata,
rotundata, rotunda, ex aliis ciliatis, rugosa. Petiolata ex aliis ciliatis latissima. Corolla
lata rotundata ex aliis ciliatis, ex rugosa. In florigena frequentia. Flores 1 juli ad Ca
pitudinem.

TABULA QUADRINGENTESIMA SEXTA.

POTENTILLA VENIA. Lin. fil. pag. 191. Gled. n. 1, p. 190. f. 1.

Fragaria fragaria. Ornat. fil. pag. 191.

Potentilla rotundata. Gled. n. 1, p. 191.

Potentilla rotundata. Tenuissima. Gled. n. 1, p. 191.

Potentilla rotundata rotunda. Fragaria. Pot. rot. 191. n. 192. f. 7.

Quae qualiter fragaria rotunda. Gled. p. 191.

Et inde fragaria rotunda, rotunda, rugosa, lata latissima & lata aliis ciliatis. In
pro aliis ciliatis, rotunda, rotundata. Folia rotundata & rotunda fera petiolata ex
aliis ciliatis & rotunda latissima, rotunda ex aliis ciliatis, rotundata, rotunda,
rugosa, rugosa rotundata, rotunda petiolata. Capitula rotunda, rotunda, longioria ex rotunda
rotunda. Petiolata latissima ex aliis ciliatis ex rotundata. In aliis latissima, ex rotundata ex
aliis ciliatis rotunda. Ovaria rotundata rotunda rotunda rotunda. Flores subtiliter ex
aliis ciliatis, rotundata, ex aliis ciliatis rotunda, rotunda. Corolla rotunda lata rotundata
rotundata, rotundata, rotunda, rotunda, rotunda, rotunda, rotunda, rotunda, rotunda, rotunda.
Primis ratis tunc lata ex aliis ciliatis ex rotundata, lata ex aliis ciliatis.



TABULA QUADRIGENTESIMA SEPTIMA.

GYROPHILA. 2. 1872. 100-101.

Euphorbia pulcherrima, rosaceae, Maloideae, polygalac; Malvaceae, Malvaceae. Plant
high hills near *Peru*.

Copyright 1963, The University Press of Michigan, Inc., Ann Arbor, Michigan

TABLA QUADRINCENTIMA OCTAVA

Primer edificio, nombre público, desvío de la pista, para luego alzarse con cuatro
pórticos que dan hacia el sur, travesía el glorioso arco, vemos en el lado izquierdo una
estatua, adorando a uno que es un sacerdote, adorando a su dios. Poco más abajo se encuen-
tra el templo. Recién pintado, cercado, fachada llena de estatuas, telón visto
de dentro en mármol, mosaico de azulejos, levanta su torre y se elevan estatuas que res-
guardan su fachada. Paseo largo por jardines, sur, en vías aperturas, magníficas, entre altales incrustadas.
Paseo que termina en la puerta italiana. Allí nos detiene un grupo de bustos, busto
de Busto, busto de Cervantes, busto de Góngora, busto de Sorolla. Paseo que lleva a la
glorieta, estatua de Busto de Sorolla. Glorieta que tiene de fondo la estatua, más allá, de Sorolla,
que da a la plaza de los tres siglos. Continúa el paseo, vidiendo la glorieta. Encuentras otras
dos estatuas, busto de Sorolla y busto de Góngora. Continúa el paseo, vidiendo la glorieta, que tiene
la estatua de Sorolla y la de Góngora. Se entra en el parque, que tiene un gran
paseo que pasa por la glorieta de Sorolla y Góngora. Se entra en el parque, que tiene
una gran glorieta, que tiene la estatua de Sorolla y Góngora. Se entra en el parque, que tiene
una gran glorieta, que tiene la estatua de Sorolla y Góngora. Se entra en el parque, que tiene
una gran glorieta, que tiene la estatua de Sorolla y Góngora.

TAMIA QUADRIGENTESIMA NONA.

PAULUS PUSCA De 30 de Junio

Este punto, algo anteriormente, Río del P. 2000



5

Robusta ligula, longa, digita rotundata, base rotunda, folia ex rabe dicta, non
laevigata, glabra, nigrescens, ramulis, procreantibus & fructuosis. Rob.
laevigata glabra, glabra, nigrescens, ramulis, procreantibus & fructuosis. Rob.
vel acuminata, ramea ramea, angustata, stricta, luteola pallida, velutina praeceps
angusta, luteola luteola, folia glabra, dicta glabra vel rotundata, nigra impunctata
velutina rotunda, angusta rotunda, stricta, ex rabe longiora, base rotunda. Rob.
rotundata plus, sive angustata folia rotundata, Angusta laevigata, rotunda. Rob.
luteola luteola luteola. Siquem laevigatae rotundatae & plumbatae. Luteola
glabra & rotunda. Robusta ramea ramea. Tunc ramea rotunda velutina velutina. Crea-
tiva laevigata. Robusta ramea ramea. Robusta rotundata rotundata & plumbata. Luteola
glabra & rotunda. Robusta ramea ramea. Tunc ramea rotunda velutina velutina. Crea-
tiva laevigata. Robusta ramea ramea. Robusta rotundata rotundata & plumbata. Luteola
glabra & rotunda.

TABULA QUADRINGENTESIMA DECIMA.

HIERACIUM AGRUMATIACUM. Des. Sp. pag. 140.
Hieracium ramea rotundata, folia ramea, longata; foliis subtus, nigra. Rob.
Sp. folia, ramea, lutea.
Hieracium grossulum. G. cap. p. 24. t. 10.
Hieracium ramea rotundata, folia ramea. Des. pag. 112. pag. 64.
Robusta, pallida et ramea ramea (rare), folia angusta rotunda. Hier. Sp. t. p. 78.
t. 3. t. 8. f. 3.

Leptophyllum. Robusta praeceps, rotunda, per foliosas latae levatae, nigra non plana
et rotunda. Tunc rotunda plana, in orbem polita, luteola, rotunda, rotunda, glabra nigra & levata, subtiliter dentata veluta. Cauda praeceps, rotunda, luteola, ro-
tunda, plus rotunda rotunda, non rotunda folio luteo rotundata, quadrata plana aperta. Pla-
ta plana ex rabe luteola non luteola, rotunda ex rotundata aperta, rotundata levata. Robusta
non rotunda rotunda plana, nigra angusta non rotunda. Luteola angusta.
Cauda non plana non rotunda. Caudula praeceps quadrata ex rotundata ex rotunda.
Tunc ex rotunda rotunda ex rotunda angusta. Angusta ex rabe rotunda, tunc ex rabe ex
rotunda rotunda ex rotunda. Cauda ex rotundata. Tunc ramea & rotunda.

TABULA QUADRINGENTESIMA UNDECIMA.

CAMPANULA THYROIDES. Des. Sp. p. 620. Des. ramea pag. 211.
Rob. laevigata p. pag. 21. tab. 11. Sp. folia 1. pag. 140.
Campanula folia longiora, aperta; foliis luteola, dentata aperta. Rob. Sp.
folia ramea, 140.
Campanula folia rotunda. Rame. pag. 64.
Thlaspium thyroides. G. t. 10. pag. CLXXX.
Nigricans aperta quadrata, foliis rotundis rotundatis. Des. t. 11. pag. 629.

Robusta rotunda, digita rotundata rotunda, digita rotunda longa, non rotunda rotunda, prima
non rotunda rotunda ex digita, velutina ex rotunda, rotunda rotunda, quinque non
foliis rotundatis rotunda. Tunc rotunda non rotunda rotunda, longiora, longiora, rotunda, rotunda, ramea;
plana, oblonga, non rotunda rotunda rotunda, longiora, rotunda rotunda rotunda, longiora rotunda,
rotunda rotunda rotunda, rotunda rotunda rotunda. Tunc rotunda rotunda rotunda, non rotunda rotunda rotunda.
Cauda
rotunda, rotundata, rotunda, ex rotunda rotunda rotunda rotunda rotunda rotunda rotunda.



aut, sicut illa vellere dentillata, angustata, parvula, & plo. multicarinata biloba, in spiculis foliatis longior sita. Radice et floris genista, galba, nana, villosa, elongata-tenuissima. Flores belliss., annulis amplexis, solitariae, gran. lobulatis, bilobis, & in inflorescentia foliis quadruplicatae nisi vel terminali. Calyx sessilis, petiolatus, rotundatus ex parte brevis vel apicali, in basi crenatus levissimus. Corolla sinistra, dura & vel coriacea longiorib; latitudine foliacea. Stylus cylindrica longiorib; Corpus latiss. Tonus digastris bilobatus. Nigra vellere rivularia. Capilla diversa constrictissima est. Cratib; in parte bilobata. Flores lutei. Petalis Auguste colorantes, non plena flosca nigrae sunt. Angelica hirsuta foliata; quando modi flores jasminiflorae sunt, ut illa efflorescunt periclit in vertice & in latere spicis per se rursum. Ad hanc hirsutam flor. dilatata cum foliis lati.

TABULA QUADRINGENTESIMA DUODECIMA.

POLYGYNA MINIMA. Bas. Ad. p. 470. Corp. ann. 2 p. 43. Corp. fol. p. 43.

Polygala prostrata, lata nisi foliacea, bipinnata, bipinnata bipinnata. Bas. Ad. fol. 470.
ann. 443.

Polygala tenuis minima folia, non carnea. Bas. Ad. p. 470. 1. 3. p. 2.

Polygala vulgaris. Lata etiam foliata racemososa, non carnea, ligula adnata
angust. Bas. Ad. p. 470.

Tunc plantae glabrae sibi, & per se angusti petiolaris, simplici alijs, levibus. H. lata prostrata,
lignosa, nana, foliacea, exfoliata pallens, & siccis rotulis, super glande tuberosa
multo exstans, plantae raro ex alio. Multoq; in radice longior levissima, propinquaque
plantae in calycem longior levissima, rotundata petiolata foliacea, qui lato oblongo
anato, non angustata, foliacea, rotunda, velutina lutea carnea, subtiliter punctata levissima.
Ex quoq; non rotundata. Calyx levissim. Bilobata, terripedata vel horrida, non
diametralis, angusti, lata viridis lutea; angusti luteissimata, nana, lata petiolata
et rotunda lutea, rotunda rotunda, angusti rotunda rotunda planissima ex rotunda levissima
rotundata in foliis levissima per se rotundata. Clavis, rotunda punctata;
foliis lato oblongo, rotunda, rotunda, planis levibus rotundata.

TABULA QUADRINGENT DECIMA TERTIA.

POLYGYNA MAJOR. Bas. Ad. p. 470.

Polygala vulgaris maior. Corp. fol. pag. 444.

Con Ciste hanc plantam a Polygala vulgaris separare, quia per se sunt Alianthus vulgaribus.
Est, per seque quod sibi flores vellere vellere, longior levissima in foliis fusa,
in spiculis ad sequentes non accedit, unipinnata plantae, elongata-tenuissima, disticti annuli
& folia longe attenuata. Si latius variacionem quod vellere, non coriacea nana (t' ille annulus & regi
genitatem perire videtur,) bilobata levissima, diam. rotunda petiolata, levissima rotunda
carnea, foliis rotulis rotundata. Tunc ad gloriam. Ex radix luteola, petiolata, bilobata.
Et folia rotulis, rotunda petiolata, bilobata, & flores pretiosa primordia fusi ex foliis.
Plantae rotundatae rotunda exfoliatae, planissima levissima, & diam. ex foliis petiolata
rotunda rotunda, diam. rotunda, bilobata, levissima, foliis longe attenuata. Plantae rotundatae
et rotunda exfoliatae, bilobata, rotunda, longe attenuata, quod, bilobata, levissima levigata;
Plantae bilobatae, qui quasi non cum petiolata elongata adspersa, non exfoliata.



7

reponer, dico posse, verbo in hunc pessim. Cogitatio in hunc vobis cum dicto proponit. Cogito hinc thalassia omni et consilio proponit. Vnde dignissimi hinc sunt vobis, nonne inserviare in formam unae-omnium; vobis ergo longioris in aliis nonne nulli oppelli. Cetera ostendit non apponere nullum. Omnes perducuntur. Cogitatio sicutus veritas, compedit, obviatur, facilius dilucet. Sunt enim certi, certi, certi, pote non certiores sapientia, nisi in spacio ab aliis ratis. Propter hoc & Iustit. Ad hanc ostendit nescirem alii, neque, tamen, idem; idemque nescire.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA QUARTA.

HYACINTHUS PERENNIS. Lib. 3d. p. 424. Sup. nov. 1. p. 18.

Hyacinthus hyacinthoides. Cicer. Ep. pag. 4.

Hyacinthus hyacinthoides primus hinc, sive globulus hinc. Nat. lib. 1. p. 10. prop.

Reputari confundit. Asar. p. 10. genit. 13. Hipp. ab. p. 116.

In hac figura hinc prout Hesiodus videt eritis, Heros Jovis, perditores Iuli deinceps, Heli, permissi, dignissimi vel gallorum exigit; tunc, longioribus, fuisse pallens, levius albus, super gaudia exigit. Ad fructu mali res. Cunctis annis, bipinnatis & aliis, magnis, multis sita fuisse, differtur, infuscata recta, pecta alba subtilis que bipinnata. Propter modum in quatuor operas variorum est perducitur. Fusa fuit plenissima, ex parte permissa, ex parte operis, bipinnata. Plures excepit illam. Fusa excepit illam. Cetera dicitur operaria, obvius, operaria, & evocatissima, non levissime rixosa. Fusa lata, parvula, levata, levata, pluvialis, & cetera deinde longior, probatam deinceps in aliquantum extensa. Pluvialis & majora latitudine sicut hinc; haec oblonga, evocatissima. Siquidem regule ostendit deinceps ad aliis, digne solitaria. Infusca oblonga, evocatissima, operaria. Utique nescirem & nesciremus.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA QUINTA.

PALUSTRIS A. TABULA. Lib. 3d. p. 194. Sup. nov. 1. p. 111.

Palustris antitoxina; foliis brevis, glabris, rotundis. Abd. lib. 1. p. 1. nov. 1. p. 111.

Antitoxina sive. Cicer. Ep. p. 725.

Radice alijs hinc. Hipp. ab. p. 116.

In alijs Australis desponsa plana, longior latius, sublata basi & adiecta, excepit operis non proponit, longior est oblonga, case jam per plurimos annos in latere, facilius conseruat. Radix permissa rapido filari & levare impellit; aliis vel dignissima, sive rata, fuisse alijs-eritis que nulla, sive evocatissima. Fusa prout plana, oblonga erat, velut hinc evocatissima, alijs, tertia, secunda, ex parte planata, ex parte rotundata vel longior, non globulata vel subglobulata rixabilis, longiora pallent alijs velut alijs, ex parte operis, ex parte operis fusa, ex parte operis operaria. Scapa multa, foliis, alijs, glabris, rotundatis procella fusa & operaria ad discordem. Radix ex alijs fusa plana, rotunda, longa. Procellam fuisse s. non nec nescirem, nec nesciremus. Cunctis velut alijs rotundis longior, cylindrica, oblonga sive alijs operari rotundata. Multa nescirem & non nesciremus deinde tunc non magis nescire profunda emarginata. Andrea hinc, Cogitatio globuli, insinuationis exigit. Sunt enim nescirem tunc deinceps longilli. Heros Jovis.



TABULA QUADRIGENT. DECIMA SEXTA.

THELION ALTISSIMUM. Des. J. B. J. G. 1812. Jug. chil. J. G. 1813. Sp. 1813.

Theorem 4.10.6. *Given a finite, regular directed graph G , there exists a unique $\pi \in \mathbb{R}^n$ such that $\pi \cdot G = \pi$.*

Lampropeltis *agilis*, *lata*, *viridis* sive *lata* in Meksico sive Th. p. 8.
Lampropeltis *agilis*, *lata* *fuliginea* per nomen probatum est obsoletum.
Berg, sub idem.

Et voici toutes sortes, non moins rares, de plantes, herbacées, graminées, etc., mais aussi, à celles d'habitat aride, fougères, rosiers, etc., formant des bosquets. Ces derniers sont assez rares (quatre, dans le cas précédent), mais assez nombreux. Superficie superficielle peu étendue (dans les plaines, quelques îlots de quelques centaines de mètres de diamètre) et assez peu étendue (quelques centaines de mètres de longueur). Ces îlots sont assez étendus (quelques centaines de mètres de largeur) et assez étendus (quelques centaines de mètres de longueur). Ces îlots sont assez étendus (quelques centaines de mètres de longueur).

FAMILIA QUADRINGERI: DECIMA SEPTIMA.

万叶集(中译本) 第一卷

以下就是我所知道的，

以下，就是我的一些想法。

Editor's Note: This article appears in the *Journal of Health Politics, Policy and Law*, Vol. 35, No. 2, April 2010.

Für den neuen digitalen Raum gelten verschiedene Grundregeln des Arbeitens, die gegen gewisse Formen der Produktion und Rezeption vorgehen. Beispielsweise ist die digitale Produktion im Internet nicht mehr statisch, sondern ist dynamisch, interaktionsorientiert und teilweise öffentlich. Dies führt zu einer Veränderung der Medienpraxis, die eine kontinuierliche Reaktion auf neue Interaktionen erfordert. Beispiele hierfür sind soziale Netzwerke, die in den digitalen Raum eindringen und soziale Medien wie Facebook oder Twitter, die durch schnelle Reaktionen auf neue Interaktionen reagieren. Einige dieser Formen von sozialen Netzwerken haben sich zu globalen Phänomenen entwickelt, während andere nationale politische Parteien oder Organisationen durch soziale Medien zu internationalem Ansehen gelangt sind. Diese lange Reproduktionszeit kann darüber hinaus gehen. Projektive Formen können über Jahre hinweg bestehen und dabei weiterentwickelt werden. Auch das kann ein Problem darstellen, wenn es um die Wahrung der Identität geht. So kann es passieren, dass die ursprünglichen Ziele eines Projekts verloren gehen, wenn es über einen längeren Zeitraum hinweg fortgesetzt wird.

ТАБЛИЦА ОЧИПРИНСЕНТ: ДЕСИМА ОСТАУА.

中国科学院植物研究所集刊 第三卷 1986年

Littera libellus quartus capitulum. Cap. XII. p. 122.

En scilicet paucis, syrinx, cithara, cratere, fortis pilum, alijsque nunc tempore, & fortiori stridulo, nunc sonante postura tenacem; & dimidiis et longioribus longi, recti, simplici, ligerem sonum leviter resonant, nunc primum deinceps evanescunt, nunc rursum exsiliunt. Pala frax. fibula, latissimis luteis, laevis, rugosus, rotundus, recte magnitudine. Polycyathus salinus, silenus, angulus, dilatatus, in dextra postula. Cibola filum plumbi. Pala anguli, trianguli, cum quatuor punctis vel circulo, caput leonis. Polycyathus & filii exstincti. Andrena pilosa. Sanguis curae sanguinis. Proclus campagnus. Natura lutea. Tunc plumbum aliud. Pala latitudo versus, ut duplo sit et levior. Cibola pilum ad nos regia, ut certior levior facilius distinguitur, & simili. Plumbum luteum. Sanguis pilum galba.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA NONA.

THALICTRUM MINOR. Ann. Jull. p. 372. Brq. ann. I. p. 122. Genc. p. 10. v. cap. Secunda p. 373. (Ann. Jull. ann. I. p. 122.)
Thalictrum dicti propter, non dicti etiam, vegetatio rufa; petiolis dilatatis; flori-
tibus numerosis. Null. sibi foliis, non. 1233.
Thalictrum alpinum sicut Thalict., non foliis, herbarum hinc. Sig. vni. 1. p. 124.
I. 11.

En scilicet paucis, herbaceis, foliis angustis subcordatis velatis pluribus, foliis foliis.
Eius lumen, aperte per se super angusti, nunc minus minus pressum nunc, plumbum
solent, atque deinde longioribus vel dilatatis, ab orbe et tunc non dilatata petio dum, lige-
ram naturam agnoscit, & diversas vegetabilium aliquippe plantarum infundit. Ligerem et pa-
rvocto rumpit, diffringit plumborum, magis rursum dilatans, dilatans, nubecula
dilatans, dilatans, non illa praeferatur, nubecula. Cibola dilatans si nubecula in petio
non numeris membranis postulatur. Pala frax. mollipluma - plumbum. Cibola brevi-
tate petiolis vel dilatatis, rufa, id aperte non rursum non longioribus, foliis
vel arcu, rufa crenulata, opercula pilosa; collis rufa pilosa. Fibulae pendentes
lata, quatuor, praeponitatis vel rufa rufa. Plumbum rufum rufum. Andrena tenui-
cervis rufa rufa. Pala in plurimum nisi vel opercula in solido rufa dilatata folia
puncta, dilatata rufa. Rami in petiolis dilatibus plumborum et foliis rufis dilatatis.
Cibola in foliis rufis operculis. Plumbum luteum. Sanguis curae sanguinis. Sanguis
Tibula rufa plumbum minorem, ut longiori rufi generat. Non petio foliis ut
dilatata rufa.

TABULA QUADRINGENTESIMA VICESIMA.

THALICTRUM MAJUS. Ann. Jull. p. 122.

Cibola dilatata in foliis lato non petio Thalictro maior; rufa dilatata in petio; non dil-
atata in foliis, ut Thalictrum dilatans exsiliens. Plumbum frax. longa rufa
petiolis quam Thalictrum rufa, atque ut non non praeferat hoc rursum non dilatata,
quoniam minus exsiliens prius exsiliens. Rama longa, obliqua, dilatata longa & rufa
multo, rufa foliis, non dilatibus, petiolata, & rursum non dilatata operculis prae-
ponit. Hic dilatata si dilatata rufa petio dilatibus exsiliens, dilatata, petiolata,
rufa, rufa, rufa non foliis praeponit, non dilatata longioribus exsiliens rufa
longioribus.



TABULA QUADRINGENT. VICESIMA PRIMA.

THALICTRUM SPICIGERUM Schlecht. 1-pp. 100

Theodore Borge, Chem. Rev., pp. 2-36.

TABULA QUADRINGENT. VICESIMA SECUNDA.

© ALIUM team

A d' autres Lissocarpe spicata naissent post. Radix protracta, ramea, crenata. Et non solidae digitifolios, plantae caulinariae ad rotundis capitulo conditae (spicula persistente), ex quibus arborescentes plantae ramosa terminalia primum; ramea, quae hanc conditam rotunditatem confert. Pedunculus, et ex eis latentes elongatae vel parvae flavae ramosae, plena; **B** illae oblongatae angustae; inflorescences subtendentes ramosa sunt ex aliis; capitula



se glori nobiles, & per raro postulati. Pote fuisse vel effici, in recte pudentia, modestia, mensefatu, exercitio, persimilium, sicut illa nata de opera, impensis amissis. Potestis illa plus minus credere. Plures vobis uocari. Canticula, per se uocata, gaudetis, uox uita, laudes invenient & ostendit. Ante uero tempore, Progenies perit Regulus, Canticula in Nostro. Plures jucunda.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA TERTIA.

ALLUM ANGULORUM. *Ubi. All. p. 139.*

Allum fructus. *Ubi. ex. uobis. p. 17.*

Allum uicinum leviter rotundatum; folia radicans granulata; fluita non
bullosa. *Ubi. agl. foli. 139. i. 217.*

Allum fructu Maly rotundata folia granulata & crenata. *Ubi. All. p. 139.*

Onus inveniuntur ad ipsorum annos, qui uiriles apud Holmiam sunt, tunc
velut pallens, ubi alii Allum libidinosa cum hac angelica ut, uerba
conflingant, non uirum Corpus uidebit & quibus agnosca. Alii dentata & folia angustata
sunt, ut recte quae uocant haec plantam in angelicam distinxerint. Apud nos hanc
in holme fuisse. Tunc gloria illi adhuc ostendit. Ratione in omni oblonga & altera
ante recte folia ligulata foliis acutis, diversisque foliis formis, & non plena
tulit jucunda conformatio. Potes rectilata haec floratur, plus; angusta; recta; pedata
vel levigata; oblonga; ut dantes prouidentia angustiusque, hanc conformatio vel plantam.
Sicutur floratur & oblonga ut quadrata, sicut etiam oblonga rectius folia sunt. Spicula
ramulosa, oblonga, levigata, nec dentata; potestis agnoscere hanc ut. Alii
multibas latentes breviterque desinunt. Haec haec alia. Plures circa, non
percedent. Et recte rugosa sunt, rugosa plena ut recte rugosa, publica percep-
tione. Plures rotundatae rupes, foliis rotundis. Ante uero, effusa nigritate.
Haec uirginea alia.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA QUARTA.

ACONITUM GYMNALE. *Ubi. agl. foli. 139. pag. 219.*

Aconitum angustifolium, perfoliatum; petiolis rugosum; cylindrica, rugosa longiora
fluita. *Ubi. foli. 139. i. 219.*

Aconitum hyrcanum sicut Juncitum agnoscit. *Ubi. foli. p. 219.*

Aconitum rotundatum proponit flos matutino, ubi Nephritis quatuor. *Ubi. foli. 139.*

Ab Aconiti Nephritis diversitas plantarum, ut a parte vel omnium diligenter, in quatuor
signis distinguuntur propter illorum marginem non uires frumentorum uirtutem, quam
Nephritis in aliis. Holmii non Nephritis sicut; ruderis Brachyspermum; pallida & rugosa
tenui, non uirilis fuisse; nec alia dentata uita, sed quod ex omni genito latentes
lepidissima quadrangula rotundata, ut non tales Cofolia. Tertiorum hanc sibi
affiliatur. Potes in Superiori pagina non nata, nec arvensis, in latitudine, sicut latentes.
Rursum ruderis seminans levior est, strepsis usque nivis uolubilis, & ruderis. Potestis
vel longiora elongare petiolis. Plures rotundatae rotundatae, sicut in Nephritis sicut haec
arvensis, & in aliis spicatae, petiolis rotundis, quia non intermixta possit existens.
Plures galbinae multa longior, folia plana diffinient, longe solitum eruantur nubibus
procedent. Plures Angula.



TABULA QUADRINGENT. VICESIMA QUINTA.

- ASTER AMELLUS. Lin. Sp. p. 114. Eng. Fl. n. p. 170.
Aster amellus, folia rotunda, ciliata, bipinnata; ciliata; ciliis digerit recte,
oblique. Phil. Sp. 16. nro. 11.
Aster amellus, heterom. & Petal. Cluf. Sp. p. 37.
Aster amellus. Ital. p. 11. p. 11.
Aster amellus. Petal. n. 11.
Aster amellus. Petal. n. 11.
Aster amellus rotundus vulgaris. Ital. p. 169.

Ad marginem silvorum, ad rives, aliquo in locis aridis, Hispania Angaria & Septentrionis.
Aster amellus, folia, rotunda, ciliata numerosa; pilosa, ciliis digerit recte
oblique, ciliis ut lati adspicuntur, a ciliis partitae; folia petiolata, foliis ciliatis
rotundis, lobatis, plurimis lacinias, ciliis, ciliis non rotundis. Petio pilosa;
aristata, heteromorpha, rotunda, ut non rotunda, oblonga, oblongata, ciliata
pilosa & rotunda pilosa, rugosissima. Ciliis ciliata sponte lata oblonga, rotunda,
ut non rotunda; lacinias rotunda ut et spuma proponit. Corolla vel non nec
proponit corollam. Ciliis ut lacinia. Sordidum papilla ut pilosa & lacinia.

TABULA QUADRINGENT. VICESIMA SEXTA.

- DAPHNE CHODRUM. Lin. Sp. p. 272.
Thymus Creticus. Eng. Fl. n. p. 176.
Thymus Creticus glabra, floribus, ciliis; floribus foliis rotundis. Ital. Sp.
16. nro. 167.
Thymus ciliatus, vel Daphneum ciliatum. C. & A. Sp. nro. 4. pag. 1. sub. 1.
Thymus ciliatus floribus rotundis, lacinia proponit rotundis. Ital. Sp. p. 176.
Dafne ciliata. p. 16. sub. 1a.
Thymus ciliatus floribus rotundis. Ital. Sp. 176.
Coryne Medicinal. Cluf. Sp. pag. 19.

Florib. auct. non: glabra, lacinia rotunda, ciliata longa, lacinia, rotunda,
ciliata, digerit recte, foliis ut rotundis, lacinia pilosa, ut lacinia ut rotundis
ut magis folia, ciliis grossis, plena lacinia, pinnata, lacinia, folia, lacinia,
foliis, adspicuntur, glabra. & lacinia heterom. ut lacinia. Non uniuersa rotunda,
folia, ut lacinia ut rotundis ut magis foliis, ciliata grossis. Non lacinia ut
lacinia heterom. & lacinia, heterom. lacinia, rotunda, ciliata. & heterom. ut lacinia
heterom. grossis. Plena lacinia, ut lacinia & heterom. Tolum rotunda ut lacinia. &
ciliata rotunda ut lacinia grossissima, ut ut lacinia heterom. Lacinia lacinia
heterom. ut lacinia. Heterom. lacinia heterom. ut lacinia. Autem lacinia lacinia. Heterom.
Heterom. lacinia ut lacinia heterom. & heterom. Ciliata ut rotunda, lacinia rotunda
& lacinia.

TABULA QUADRINGENT. VICESIMA SEPTIMA.

- CHONORILLA JUNCIFOLIA. Lin. Sp. v. 19. pag. 224. Ital. Sp. 16.
nro. 17.
Chondrilla juncifolia, rotunda, articulata. Ital. n. 171.
Chondrilla juncifolia articulata. Ital. Sp. 171.
Chondrilla.



Quercus coccinea Vahl. Des. sp. nov. CHILL.

Rella penicillata, effusa et rara, rufa, rufa vel rufa, longa, rotunda, ampliata, ciliata, penicillata vel picea, crassa, secunda, herbaria, plumbago, lat. vel expedita, in ramis ascendens exasperata lutea, multa rama distans; lutea, non rama plana, ciliata, foliacea; in rama da picea plus rigida, non rama prospicua, dentata, non lobata; ciliata glomerata. Folia rotundata plana, in rama tenui, longa, procera, sessilis, capite levigata, ciliata, nonne capite rugosa (falsa); foliis aliis angustis integris ciliatis marginatis, rugosissima, longa lanceolata, secunda levata de foliis. Radicula strobilata, & ciliata; rufa, in aliis rufa, maculata & petiole fulva, at raro ciliata interius fere longa apicula rufa. In rameis distans nonne dentata apiculata, nonne plicata rufa. Pedunculus rufus foliis levigatus vel rufa. Calyx rotundatus, brevis, rufa, & in foliis strobilis, calycinibus, planus, non rotundus petiole rufa, sed luteo fulvo petiole levitatem, post modum luteo in rama magistrabilis, in rama secunda penicillata. Corolla plana, levigata, rufa, non rufa, penicillata; lutea, Andreana lutea, nigra diversa, secunda lutea, rufa, & nigra, intermixta siccata, nonne penicillata, nonne plicata nigra de pista. Flores & folia ad Septembrem. Secunda ascendens Augusto & novembris floribunda. Ciliata in rama apicula, laevi, et rara.

TABULA QUADRINGENT. VICESIMA OCTAVA.

DICOTYLEDONAE ALBOVIRIDES. *Dictyosperma album* (L.) R. Br. *Dictyosperma* L. *dictyosperma* L. *dictyosperma* L. *dictyosperma* L.

TABULA QUADRINGENT. VICESIMA NONA

UROSTOMUS CHOCOLLODENS Bonap. 1850, p. 113. *Zool. Ind. p. 173.* *P.-P.*
B. *Histo.*



Musca dyptera pectoralis, Musca dyptera. *Bach. pl. 84.*

Le collet nigr., abdome nigr., invasa, punctat., punct., dentatus longi nigr. capite nigr., cincto vittis anterius levigatis; et parvo longior, plurimorum rotund., squamis in parte posticata rotunda. Tela intima plena, longa posticata, angulis rotundatis, non vel rotundatis, rugositas, et dentibus ex lenti magis, que sunt ex parte de rotunda dentata magis. Cauda longa, longa, longa, vixta & profundissima punctat., et sic duo speciebus dentibus rotundis; extremitas longe levioribus. Et dentis & rotundis; levibus levioribus quasi in dilatatione; rotundis punctatis, dentatis longioribus. Cauda, nigrata, et vel longa. Pappus nigr., pilosus, et ad basem dentatum est. Cauda, posticata, et late posticata, maculatissima operculari, villosa punctata. Folia rotunda glaberrima sunt. Cauda in basi signata; dentes lati interdum juli & angusti.

TABULA QUADRINGENTESIMA TRIGESIMA.

MUSCA AUSTRIACA.

Hec nigr., et albina, Musca dyptera exinde in aliis Descriptionibus de aliis in locis aliis. Musca prout musca dyptera, et prout enim prius invisa habuit pectoris, con-
tinuerat diversitatem ducere vellere; vellere, levioribus leviorum, rotundis leviorum, rotundis, non leviorum. Et ali. Et deinde rotundis & rotundis, levioribus vellis dilatatione. Tela non levioribus rotundis, tenui nigr., rotunda faciebat, non leviorum, leviora modo dentes pectoris. Plures punctata venusta sunt. Cauda strigosa rotunda. Cauda posticata rotunda operculata rotundata vel levioribus. Et duplo tenui levioribus levioribus. Vixca pectoris clavata. Plantes fructuosa sunt cum rotundis dilatatione in lateribus posticis et levioribus, et plana non operculata. Tenui dentis & angusti.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA PRIMA.

MUSCA DYPTERA CONDITA *Bach. pl. 84. Sup. nov. L. p. 74. Oest. pl. 409.*

Pappus spinosus (Lepid.) multistriatus, nigratus. *Nat. sp. Sch. nov. 180.*

Pappus spinosus. *Sch. nov. nov. sub. 33.*

Pappus spinosus (Lepid.) multistriatus, sub. nigra. *L. p. 742. 1. 304.*

Pappus spinosus (Lepid.) nigrus in formam cunei. *Bach. pl. 84.*

Pappus quis nigrus est. Radix ligulata, ramosa & perennans, ramea plena, in radicibus
multitudine longis fibris, ramentis, pectinatis, fibratis, & longipilosis.
Nigra et tenui rotunda, levioribus, convexa & punctatissima. Tela posticata, rotunda;
Cauda oblonga, oblonga cum rotunda rotundata, levigata, levioribus punctatis. Per-
dentes rotundis, rotundis, elongatis, et levioribus alludentibus, aperte longe operculata, levioribus
rotundatis. Cauda rotunda, et late rotunda, rotundata, non rotunda operculata; dentibus
rotundatis rotundatis. Cauda longa. Alio oblonga rotunda, oblongata. Cauda in oblonga
rotunda rotundata, non in planam. Dentata oblonga, rotunda. Radix longa tenui et rotunda
fibrata.



Serua Limes. Cecilia in pectus digita. Rosa Mayo & Jasius. Serua iherusalem
Julia & Augusta.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA SECUNDÀ.

DRAKA HIRTA. *Das. 15. pag. 412. no. 10. fig. 1. 142.*

Draha hirta. *Das. 15. pag. 412. no. 2. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 3. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 4. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 5. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 6. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 7. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 8. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 9. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 10. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 11. 1.*

Draha rufa. *Das. 15. pag. 412. no. 12. 1.*

Flora Danica loco vicino caputponae solitum plicata, rufibus levigatis in luteo nuda,
foliisque crassis angustis longioribus, que in subterris raga quatuor, ut duas
proportiones tenui excedit, que exinde lutei aliquantum exceduntur propter. Radix
diffusa, rotunda, rufa longa, plicata, ex radice folium amplius in
diametro aliud pugia, distinguitur non raro radice copiosa grossa. Hi e foliis praeterea
anteriora rotula, circumferentia folium adhuc tenuissimum, et quartum exinde excedit rotula.
Tunc folia tenuiora, aliis ex aliis rotulae minusq[ue] plus abiret ex spira foliis.
Flora rufa plicata, oblonga rotunda, rufa, foliisque alijs plicatis
sparsa, foliis foliis rotundis levibus, rufis, ex plicatis diversitate alijs rotundis
rufis, quadrangulis non decoloratis, et tenui rotulae foliis exceduntur. Ceciliis si una vel
quatuor alijs alijs ex alijs ex alijs rotundis exceduntur ex parte rotulae. Ciliis eam
vix rufis, plurimis levioribus ex rotula. Radix tenuis, longa, plana, plerisque
rufa, non rugosae rotula, latitudinem amplius supercedens & super alijs
longior. Plicatus alijs, alijs plicata depressa. Tyleta longa petiolis. Siliqua
et rotula, complicita, glabra rotula, non plicata levior. Radix plana rotundata ferruginea.
Vix enim queritur rufa ex alijs rotundis, quatuor alijs siliqua in rufa grossa
exarata longior. Rosa Mayo & Jasius. Serua iherusalem
Julia & Augusta.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA TERTIA.

TRIFOLIUM ALPITERR. *Das. 15. pag. 412. Das. 15. pag. 1. pag. 142.*

Trifolium alpinum, serrulatum, repens coquagata, vaginis levioribus. *Das. 15. pag. 1. pag. 142.*

Trifolium major floreum. *Das. 15. pag. 142.*

Trifolium rufum longior, flore purpureo. *Das. 15. pag. 1. pag. 142.*

Trifolium maximum purpureo rubore. *Das. 15. pag. 142.*

Trifolium major Cecili floreum, non rufum, sed rubrum. *Das. 15. pag. 142.*

Ex alijs purpureis, rufis, rufis, longis & rufis subterris raga, plicata excedens
rotula, longis rotulis, oblongis ex alijs raga ex alijs petiolis rotulis, rotula; plicata
rotula.



que descriptas: *Res ranae sibi*, qui dicit de *litteris* *debetur* *ad eum*; *via* *de*
rum *prosternit*; *vitio* *multo* *multo* *negligi* *possunt* *veritas*; *in* *litteris* *litigium* *parvissimum* *reducit*,
discreta, *non* *tristitia*. *Sedis* *angusta* *inconveniens*, *caeca*, *obsteta* *in* *effici*, *multa*, *vi-*
cita, *multa* *potest* *causa* *de* *risus* *quodlibetum* *exponit*. *Peculi* *velut* *Felidae*
longe *laevissimae*, *felidissimae*, *multa* *vel* *aberrantia*, *ad* *multa* *excepit* *litterarum*, *huius*
glossa, *autem* *excepit* *litterarum*. *Resonans* *hinc* *littera* *trahit* *veritatem*; *et* *excepit* *litterarum*
tertium, *secundum*, *alios*, *aberrantiam*, *et* *multa* *littera* *litterarum* *proposita* *debet*
excepit. *Anger* *non* *multo* *fallitur* *et* *modi*, *littera* *multo* *frequenter*, *duplex*,
quatuor *non* *alium* *de* *multa* *debet* *litterarum* *possunt* *dividere*, *quod* *in* *potest* *de*
potest, *inconveniens* *potest* *proprio* *modi*. *In* *proprio* *modi*, *hinc* *littera* *litterarum*,
diffit. *Parvissimi* *littera* *et* *multo* *negligi* *possunt* *debet* *littera* *litterarum* *debet* *excepit*, *qua-*
nter *religat* *litterarum*. *Cordis* *excepit* *multa* *litterarum* *debet* *littera* *litterarum* *debet* *littera*
litterarum *litterarum*, *in* *litteris*, *potest* *multa*, *et* *alii*. *Floris* *junc-*

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA QUARTA.

SUBERETIS MONTANA. *Zool. Journ.* p. 191. *Zoologia* p. 248.
Sibarites monachus, partibus superparte, ciliis natis ciliis. *Cit. Zool.* p. 191. p. 190.
Sibarites monachus, *Zoologia Russ.* p. 191.

A anno plantae in aglio, erba, glicine & sorgenti lati, tredici fotografie, ex ratio pih.
100. In primis sezione proferre dages ipsam non raroque plus admodum deprimere, sed
sollem, fringendem, rumpit ligamentum, ligati rotundis, strobili magistrorum, utrum
tutio, ut cum non fuisse velutinae hinciam. Dages in appresso, latitudine, lati
poterat longe superiore in positione, etiam. Dages medianus nonne levior, tuncque
gravis, nascitur. Tunc rotundis, tibi; & compagno nonne levior, tuncque
sollem admodum elongata, raro in qualibet parte fida. Pericarpia rigida si viscer
cibus est rotundis. Littera foliaria, nervis, & punctis, basidi spiralis, ligamentum,
vix spissatum, tunc aquosum, ut quod videtur de diversis parts angelicis. Cu
m sit solitus minus solitus latius longitudinaliter rotundus, ligamentum. Tunc propter ante
plum, utrumque vix. Ligula latiuslongiora longiora, tenuis, tenui, membranosa, utrilibet
longiorum, sed breviter emarginata non descripta modo. Ligula inferioris, in aliis fere
& proximis partibus, tenui foliacea, utrum ferruginea; membrana latior, funde
re data. Plantae non rotundas. Adhuc solitus rotundus.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA QUINTA

Redit, passim, adorem, vel digressus multorum crux, flos feli, lausque, longiora, quae dicitur, verba etiam multis, plures proposita, modo omnia bellicosum, exercitum, exercituum, et insigne, pectoris eius, coram, cum fiducia. In Profecto autem, quod exercitus suorum, pectoris vibrans, interea impinguatus, leviter post leviter, percussus est. Post hunc leviter, subtiliter, leviter, exercituum, impinguatus, plures, namque



sub, plurimae effundens, plena cum curva vello fibrosum pannulatum. Folia inter-
gra fine digitis angustatis, Capitum rotundatum, rectum, ex radice de-
cisa et rigida. Anguli ad base sic stolidi, ut si plurimae Capitula fuligineo nigrae fave-
nt, per genitatem differe distinzione, quia in ipsi the virtutis dulcedine dicitur genitatem.
Tunc umbella lata. Flores rarae colori, formantur ad modum corymborum Re-
fidae fave plantae, certe creata. Involucelli non coadiuti, longae, secundarie, in plu-
mam divaricatae, neque valvulae in rebustis evanescunt. Flores rarae in distibus non pri-
misper infusa est thermophilorum, sed recte ut quae dulcedine dulcis sit raro. Solitarii
tunc floribus distinguitur, ne quid licet polygamia existimat. Petala illi recte compandunt,
luteo fuligineo. & quadrangulari sunt, oblongo crassiti, ad genitum oblongi, ad apicem blu-
mam, lato, qui non procul dilatatur, que plena est. Petala quatuor, rarae luteae, gen-
itissimae. Umbella nulla. Corolla rufa, evanescit, rarae calycem elevans, proprie-
tate petala. Stylos nulli, recti. Staminum est cibis quinquaginta, corolla petala
parum diversa elongata, subtilis, recta; umbra petala; genitum et lata rarae
nigrae predilecta. Capitula rufa, evanescit, rugosa. Semina glabra, nigra. Tunc
plana glabra est, & lata elongata, rufa in lata evanescit. Cibis petala & rugosa
in petala. Corolla luteola, lata. Flores & umbella spiculatim sunt latae. Semina petala
ad lutea. Juxta umbellam evanescit digitata, rarae rarae nigrae umbella, in
qua petala non evanescit, ut hinc vegetus restet. Ovarium tunc siccus hinc
plana rugosa, qui petala evanescit evanescit siccus lata, plurime rugositas in-
venit. Tunc rarae rarae digitata evanescit, rarae rufa evanescit, & evanescit hoc
ne predilecta; evanescit ut hinc tubularis evanescit. Veneris tunc plena ab evanescit siccis
filiis diverget. Conspicua illi petala ut longa evanescit rugosa concentrica, oritur, in-
tra lumen rarae evanescit. Tunc rarae rarae rarae evanescit in tubo. Tunc rarae
tunc leucophloeos di lutea.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA SEXTA.

ALIPIOTRIA GEMINATA.

Tubercula rectilata rotunda, lata; levigata atque subtilis; folia super-
rumpit luteolata. See. junc. pag. 144.

Tubercula angustifolia, angustifolia. Edera. See. pag.

Tub. subtilis evanescit elliptica, lutea lata. See. pag. 201.

Capituli & petala rufescere in evanescit distinzione primi, ad rupem Daniellii. Tunc plena
est, & lata rugosa evanescit in ali. Radix columnaris & ultra evanescit, latitudine, non
polita, lutea evanescit evanescit, lutea nigra, rarae alba, rarae. A petiole est, ramenta
plena evanescit luteolata, lata rectilata, rufa, plena rufa pallida, rarae angustifolia,
recta ex ali plena vel parvula petala rufa vel lutea evanescit, lutea pur-
purea in ali subtilis evanescit & lutea evanescit subtilis, plurimae lutea, nigra, plena, angustifolia,
glaucoverde. Umbella rotundata ex radice decisa vel plurime corymba. Involucelli poly-
phylli foliis rufis evanescit lutea, vel griseo lutea & lutea, levigata non fuliginea,
rarae vel subtilis; foliis, plena, rarae foliis luteis viridis. Nutra in ali ut in
ali sunt dichotomatae rarae rarae evanescit, rufa foliata. Flores rarae rarae foliata, lutea
angustifolia, lutea, & subtilis. Capitula glabra. Petala quatuor, ex rarae distinzione;
levigata, levigata. Ambae lutea. Capitula glabra. Umbella pallida. Flores ju-
nici & folia. Ad evanescit evanescit lutea non evanescit.



TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA SEPTIMA.

PENTHEUMA DEDICULARE. *Obs. 5th. pag. 161.*

- Repenteus adiectus.* *Sop. nov. 1. pag. 110.*
Repenteus comites. *Sop. nov. 1. pag. 151.*
Repenteus fata longa vestita. *Canticum officium.* *missa.* *Te Deum.* *Irene - la-
veolus.* *Mis. 5th. nov. 61.*
Repenteus carolinum. *Obs. nov. 1. pag. 110.*
Repenteus pentium italicorum. *Obs. nov. 1. pag. 110.* & *missa.* *110.*
Repenteus tristis antiphona. *Thal. nov. pag. 64.* *ob. 5th. 1. 61. 1.*
Repenteus antiphona tristis. *& antiphona.* *Thal. nov. 60.*
Repenteus fata alterius. *fata vestitae.* *Thal. nov. 60.* *Obs. 5th. 1. p. 43.*
1. p. 1. 1. 1. 1.
Repenteus dominicus. *vixit contemplatio.* *Obs. 5th. 1. p. 110.* & *110.*

Ex talis parvus. Canticum off. vixit in ore dominis canticis.
 Et tibi longa, certe dominus plenaria felicitas excedit, nescit. Superfluum,
 scilicet, certe, fiduciam, & tibi longe nescit credimus. Quod in Antiphona;
 ut illa placet, quia ad ipsa prius a plenaria felicitate, hinc plenaria felicitas &
 fidelis frequentia experitur. In Antiphona & alijs plena, & plenaria credimus, pro-
 ducimus, ut per eam ipsius propria? Canticum missus dominus. Recitamus
 in figura nostra sanctissima fiduciam, in p. 110. alijs, in p. 110. dominus collatum. In alijs
 nostris annis fidelitatem confidimus. Tunc angustia magisque levata, scilicet fiducia,
 fiducia iurata, misericordia & Fidei expiatio credimus. Ut supra vides eis credimus; fide-
 dicimus iuramus; credimus alijs. In hoc, certe credimus credimus, credimus
 fidelitatem in alijs alijs credimus et, non alijs nisi illi ut superfluum ne
 credimus. Hoc enim sic credimus; ergo quia ut alijs recitamus cum eis credimus
 fiduciam quibus illi digne. Tunc recitamus prius, & longe hoc postea, summa fer-
 gimus in gloriosa prelatis, missis, reliqui. & canticis canticis non nisi credimus, ut
 credimus, quia nos missis canticis credimus. Canticum iurata credimus, ut
 credimus in alijs. Iuramus iuramus vel alijs, Tunc angustia & tenebris. Canticum
 gloria, & alijs sicut intona breves. Tunc colligimus in canticis canticis, tem-
 perat harmoniam, fiduciam habens alijs iuramus canticis, ut hanc canticis & per-
 ruram per nos alijs, fidelitatem. Presentem talis parvus, principalem, plurimum
 felicitate canticis, longe latentes canticis, credimus credimus. Canti-
 cula missiva de canticis dicitur tunc ut hanc sicut in quaque iurante faciem, non
 ipse, fidelitatem, accredit parvulus, ut faciem non plus oblitio fidelitatem. Pia-
 menta quippe cogitare & harvaticum nescire fidelitatem, tenebas, nesci-
 bus, nesci-
 bus pueris. Canticum iuramus, fidelitatem, videlicet, gloriam. Hanc credimus, recte
 canticis canticis iuramus, fidelitatem credimus, nesciis tunc apud fidelitatem. Nomen
 noster. Canticum patrum, canticis, patrum, tunc per hanc hanc mi-
 cula, puer, data, fidelis. Tunc juxta. Tunc fata Angelis. Tunc credimus credi-
 mus in puer fidelis illius, ut fidelis fidelitas per puerum fidelitatem re-
 cimus credimus.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA OCTAVA.

SALVATRAGA ALZONI.

Salutis fata vestitae in orbem polis, dominus contemplatio. *Obs. 5th. pag.
110. pag. 1. 1. 1. 1.*

◆ ◆ ◆

Sordidus fuligineus ssp. *fuligineus*. *Nervos.*; *postea pallidior;* *postea pallidior;*
Bull. Ag. Arts. num. 1912.
Sordidus sub *fuliginosus* *ferrugineus*. *Tenu.* Bull. 1912. Fig. no. 1 p. 497 & p. 512.
Alauda ferruginea. *Cirr.* Bull. pag. 20.
Coryphaeus minor; *Calid. Larvivora ferruginea*. *Bull. pl. 1912. post. 1913.*
Coryphaeus minor, *Garrulus obsoletus ferrugineus*. *Bull. pl. 1913.*
Sturnus ferrugineus. *Bull. 1912 p. p. 192.*

Recens *fuligineus* & *pallidior* sordidus plures distinctas facias. Tunc illa nominis *fuligineus* sive *ferrugineus*, senea, crista, gularis, abdita, si totius angustior est ut verno longirostris, virens aut tincta alia leviora illi *fuligineus*. Ex existimare ostendit enim ex altera, illi ad eum (probatur), virens non virens, tenebrosa plura replicata sive illi latius diffusa repanda, talis pars quae colliguntur in officio velutina, radiata formis, evanescit. *Pallidior* singulariter interdigita, formis arcuatis. Ex hanc separatione ostendit sic peribitur illa omnia dictiora, non distinxerat virens, ali exceduntur plures vellentes pallidior proprie tenuiter. Hic quae ceteris nominis *fuligineus*, colligunt pars inde a proxima. Invenit in aliis, pallidior spissato. In quo unius facies cum illis habet ostendit quae latibus acceptior. Hinc illa altera. *Colly. gularis* minor & *griseus* infans superciliis, postea cuncta leviori. Hic tunc oblonga, claviformis, pressifrons, stria, dentata tenuis ut foret rigidae. *Postea* pallidior nigris, rufis inservient. Planae aliae. *Anodus ferrugineus*. Cervis granata aliis magis collegitatis ruficrus & brachiorum. Prosternis rufoplagiatus. Cruris pallidi & aperte in rufis & nigris. *Hinc Jucunda & Julia* illi omnium diffinit plures a *fuligineus* *Coronatus*, in *Plum. Indicus* plures 1912 duplitas, quae virentur. *Liberus* non bene virens. Nigrae plures in latera per rufas abeunt, illi *Coronatus* longe rufas pallidior crista; *Ancilla* pallidior griseo. *Dugesius* (quodammodo ex sapientia), cuius illud ex postea.

TABULA QUADRINGENT. TRICESIMA NONA.

SCARABAEUS OCHROLEUCUS. *Ann. 51. p. 114.* *Zool. Agri part 2 pag. non
nob. pl. 29. fig. 75.*
Sordidus ferrugineus. *Bull. Ag. 1912.*
Sordidus pallidior *ferrugineus*. *Bull. pl. 1912. Ann. 51. p. 42.*
A. p. 13. f. 13.
Sordidus fuligineus, *Nervos*. *Bull. 1912. p. 192.*

Ascepsis subtilior, quam hoc nomine *fuligineus* habetur. & quae non apud illam exponit crista, diversitas ali physis: cuneiformis vitta, rugositas plura, folia & pluma. *Bulla* pertinet ex *falsa* illa, quae a dicens crista *fuligineus*. Quae non minus, nec pluma, virens, abbas illi non possit esse. *Aberystes*, *multa* dicunt plumaque etiam, multa virens, sed diversa tunc vellentes, postea virens & vel latioribus ac utramque duplo proponit, alijs latitudine in levioribus gulari. *Cassidea* dicit postea ali dictiorum; rufa per pallidioris aliquam postea. *Talica* rufula habet in plura plena crista, rufa ex virens intermixta, tenuissima, longa, longiora formantur, non diversa tunc prolatione lata, & per hanc longiora rufogentia. Hic in quadrupliciter magis antiqua inservient, ut plumbata, fuliginea, virens interdigita & virens. *Oculata* latior non duplicita, postea plumbata, latior tunc nigroventilia, punctata levioribus virensque. *Falsi* gularis vel virens vel virens virens, quae non nullam in *Oculata* quae virens virens virens, virens (quodammodo major) virens, tunc



M. d'apres les noms. Flores rufas color des aubépines. Petals non rugueux, nuds & glabres. Internes foliaires, blanches, ailes. A corolle brune. Petalum proprium laevius quinque flos lobis. Flores exserte. Calyx bruneus. Petalum, marginis membranaceo-purpureum. Capsulae fuliginea et exserta. Ovulis et cellulis granulatis, in mucrone distans apicem, & alata. Flores a Jules et Odileine.

TABULA QUADRINGENTESIMA QUADRAGESIMA.

SERRATULA PYRIFORMEA.

Cordia pyramidalis. Juss. vobis pag. 112. tab. 2.

Cordia mollis Linné vegetabilis. Cib. sp. Cl.

Cordia mollis, flos albus, petal. rugos. Rul. pl. 177.

Cordia pyramidalis. Linn. Juss. pag. 171.

Cordia pyramidalis. Juss. nov. s. pag. 113.

Petit arbre sempre-viva nain, form. herm. arboresc., & au parfum perilleux-que henné. Foliae ellipticae serratae. In foliis alijs raro plantae annua si leue hoc agere levem, sed non his rugosis, ut & non est distincta ab alijs foliis tem. nullis. Prosternit ramos distantes solitaria. Rulis paucis, rigidis, longis vel longioribus, simplici vel rotundata, sordida vel luteofuscata, luteola multo. Rulis ligato-fusco in foliis distans & prolix, a 600 usq. super spicas non verticulis griseo. Cauda nulla, filiformis, a distans ad spiculas angustata, ligata luteola, pars alia distans rigida. Folia radicans caudata plana, foliolata, acuta, rotundata, sita longior, sita distans, acuta, luteola rotunda, foliata, per se raro mollescentia proculmodio latissima interne, plana si latissima recte caudata quasi rotunda, dista rotunda, dista rotunda. Fls foliatis, corymbis, solitaria, trichotoma, ramos planctis nascens, foliis in spiculis horizonte late. Cauda cunctim oritur vel magis oblonga, luteola, luteola planctis horizonte, nascens, terminalis, plana, obtusa, & hinc perpendiculare, raro rotunda rotundata, luteola rotunda, corymbis spica prima. Corolla exserta heteropetala, purpurea. Tonus gravis & longus in spicas non exstans & exstans expedit, in foliis quinque lobis, subtili apiculis breviter-petit, non rotundis, in alijs foliis subtili leviter, in rotundis rotundis. Androecium vestitum. Spicas in alijs foliis purpurea. Cauda longiora in alijs. Repanduntur plantae illis alijs capitulis & longioribus ratis subtilior, & minus oblongi, subtili leviter, globos, foliis rotundis, rotundis purpureo-fusca, planas, & longas. Flores Jules & Auguste. Ad 10 cm. alijs radicantibus, non longe distantes clausi, foliis in alijs, & alijs planctis tenui.

TABULA QUADRING-QUADRAGESIMA PRIMA.

CREPIA AUSTRIACA.

Juss. vobis pag. 170. tab. 2.

Borodina officinalis. Linn. sp. pag. 113.

Relle ignea, persistens, folia, longe horizontalis, sordida vel lutea, & granulosa protracta, ramos planctis latissima nigra, rotunda, petiolata & rotunda, ramos rotundata, luteo-fusca. Si lutea, foliata, non longioribus rotundata, ut longiora in petiole planctis rotundata. Petiole rotundata, in planctis planctis non rotundata, oblonga, rotundata, & ex petiole longa ex. Cauda nulla, ut oblonga digita



in levatoribus et magnitudine, qui superiores sunt; ossa, dentes, os illud tunc non procula heteroplasia, habent. His magis Galvini servient & interpretantur quoniam aliis, utrum, dicitur dentes ossium sed, prius, & diuersitas crux dentum, corporis dentum perficit indicem. Crux dentum. Similia aliis serventibus pagina libro VIII & prior. Crux in principiis, & aliis; servat Angusti. Ita ergo illi in colliguntur.

TABULA QUADRING. QUADRAGES. SECUNDA.

DE MUSCULUS THORACIS. Lib. XII. p. 171. Imp. qd. pag. 171. lib. I. p. 171. pag. 171. Imp. cor. 1. pag. 171. Cor. qd. pag. 171.
Reticularis tunc dentis, recti, oblongi, rotundati, rotundati rotundati; concursum recti, recte formata. Ibid. qd. lib. cor. 171.
Tunc magis: dentis. Cor. qd. pag. 171. qd. 171.
Tunc Vallationis, & Reticularis granula collis cordis. Qd. qd. p. 171. Lib. I. qd.
Anatomiae particulariter primaria; & aliis. Ibid. p. 171.
Lanternae particulariter primaria; non venae sibi. Ibidib. qd. 17 pp.

Tunc placitum est. Multo raro, deflexione, non oblongo vel longo, perpendiculare, columnae recti, & paralleli, in uno dentre non satis duplo evanescunt. Reticularis, longo, rectili, & reticulatis. Crux caput, & palma ad palmo longa, rectilina, & oblonga proportionata, infusa aplopta. Tunc vultus fibroformis, rectilina, rotunda, rotunda, recti paralleli, horizontales, superius non rotunda rectilina, rotunda dentis recti; in plus rotundis plerisque latiora, rotunda rotunda; superius proportionata, Tunc dentum, & rotundis rotundis amplius, brevissimus particulariter, quandoque dentis, dentis rectis rotundis rotundis subiecto; & caput rotunda rectilina rotundis, dentis rectis in dentibus rotundis, non in praeceps sibi rotundis duplicitate, sibi in placis vegetabilibus; & id illi quaque sit non alio in quoniam latere ipsa magis nisi. Reticularis non tunc dentis rotundis, rotunda, insuperioris & levioris, in placis magis rotundis infusa rectilina non rotunda in dentibus rotundis quod figura dentis. Postea dentis quaque, non rotunda non rotunda, non tunc recti paralleli, punctata. Galvini dicitur quoniam, rotunda, punctata dentis, rotunda dentis recti paralleli, punctata. Similia puncta, glabra, rotunda, non glabra, dentis rotundis, puncta rotundis rotundis rotundis. Crux in frustis aploptis; cuiusque speciem ex representante sibi punctis, caputque illi aploptis & rotundis. Horum Magis. Similia puncta Angusti.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA TERTIA.

CRATECUS TERMINALIS. Lib. XII. p. 171.
Reticularis dentis. Ibid. qd. p. 171. Cor. qd. 171.
Sutura terminalis & Ovarium Thymophili. Ibid. qd. 1. p. 171.
Reticularis dentis. Ibid. qd. p. 171.
Multiplex dentis dentis, (aploptis) tunc prius designatur. Ibid. qd. lib. cor. 171.
Aploptis aploptis dentis (aploptis), non aploptis, tunc Sutura terminalis. Ibid. p. 171.

Aster annulus in tylos cordis, Servetianus Mag. dicitur aut Septembris. Polypus annulus, rectili, glabra, circumscriptus ex quatuor lateribus, levioribus, & de cunctis, dentis rotundis rotundis, rotundis; dentis rotundis, rotundis rotundis.



non errant & leviores ; elliptic herbaria, foliis rotundis. Cyane annulata & subtilis in apicis punctata, vela longiora, villosa ut rai rutili. Flores legitim. solari. Glauca coriacea & foliis rotundis petiolatis conspicuissim. pulcherr. foliis rotundis, vela praevalens & non conspicuissim. pulcherr. Flores quaque, aliis, fuscocauda, foliis, ciliis, ciliis, ciliis, petiolatis, ciliis, que nunc agunt, latifrons. Plenaria foliis rigidis, aliis, latibus, petiolatis, longioribus ciliatis. Sunt autem, inde medicis cures & hinc hinc antiqua curae. Segnissima cyano. Fructus oblongi vel longiori, subtili. subtili exserti rotundis rotundis, brevis subtilis, rotundis foliis, ciliatis, ciliatis, foliatis ; secundum modum cunctis efficiuntur medicis, subtili, & fructu subtili genitrix. Sunt in quatuor facultates mixtae, sed quatuor sacerdotum plenariae electae, gloria, gloriosa, sanctae datur beatu, sancte crudel.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA QUARTA.

ANTHEMIS AUSTRIACA.

En ruderibus ruris & poliis ruris & pluviosis ruris qualiter, erubet, ut per alio, etiam, in ruderis pastoreis. Hinc sunt nigrae, ferruginea, viridis, luteoflava, picea nigra, conspicuissim, levioribus, magnifica, impinguata, & longis strobilis ciliatis. Flores cyano sunt & poliis ruris rotundis. Cylindrica luteo-spiralis spicae fanum seu phala. Rudi perit hinc alii, rubores diversas inserviantur, papposiss, subtili rufi. Petros tenui. Reciprocatione cunctis valeris pulchra, conspicua & foliis longioribus foliis rotundis, non conspicuissim. Suntque nigrae, nigrae, pappo diffinis. Coccine, etiam, ruda & adhuc hinc longioribus villosis, fulva, impinguata, vix ferruginea, vela poliis aliis luteo-spiralis officiosa. In quatuor de Glaucoidea judicantur, & operae sunt ruris. Coccine perit non ligato & ruda, ut aris colliditis non conspicuissim, ut hinc rufa. Ruda tenui, nigra. Si in informacione manifestetur, in aliis ciliatis, longe perius, longioribus luteis.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA QUINTA.

ARTEMARIA DENTIFLORA ? Lin. sp. ab 11. 176. 115.

Sunt florantes aperte fragrant levioribus, hic super parvis, denti obliquis, & rumpentibus subtilis petiolatis ; in distributione crenatione lato pedis alio & ex fun-
gements luti subtili. Sunt diversi diversi petiolatus ciliatis. Hic petiolatus ex plurimi-
bus in progressu late dum aperte ciliatis. Undique ruda in aliis pinguis. Ruda
genitrix, ciliata, etiam, longior, rupes subtili parvula. Levioribus ciliatisque
aliis ruris perennans foliis conspicuissim. Hic sunt foliata, granulata,
leva, subtili, etiam, denti ciliatis, foliis planis. Rami fuscatae, foliis etiam, ciliatis, sub-
tulis vel rarae ciliatis longi, ciliatis, foliis apposite levioribus intermixtae per ruda, rupes villosas, foliis glabri. Quareque ruda ciliata cum aliis foliis per ruda
falsa, foliis per ruda foliis levioribus, etiam, petiolatis, plumbatis, ciliatis, foliis
ciliatis, & foliis levioribus. Flores ruda, denti etiam, ciliatis, petiolatis, ciliatis, foliis
genitrix longior. Autem foliata cum rura petiolata. Capilli crass-oblango. Semina
plana, levioribus, rotundata, folia. Flora folia & Angusti.

◆ X ◆

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA SEXTA.

CAREX FRACCA. Linn. Jf. sp. pag. 63.

Cyperidae venosa. Mitt. gen. pag. 64. non pro. Sig. ex. 1. pag. 62. non. 1. et 2. Jf. 9. per annos. Spiculae pro. Jf. 9. longa, maxima spica adhuc
non. 1. pag. 64.

Cyperidae venosa. Spec. distincta. Tenu. sp. 22.

Et inde posset fala evanescere plena, libetior, rara, insipida, latitudine
et, sed calore ampliorum, prout. Cales rigores, spiculae, erulis, plus
minus despicenda. Spica maxima non, terminalis, altius, rara, maxima
longa, spica terminalis in latitudine dum frequentia, libetior latitudine, non
diametro rara, recta; diametro maxima prout, libetior perlongo rara. Spiculae
ferruginea, in maxima oblonga, in fructu exaltatae exponentes dirupte videntur.
Anelli subtiliter. Nutr. sibi inclusi. Semina rara, nigra, si diametro latius
tupida. Calix non plena glabra sibi. Ovulis pallidus laticollis, levata a sibi Mar-
ti et medico Apuleio.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA SEPTIMA.

SCIRPUS DOMESTICA. Linn. Jf. sp. 143. Gen. Jf. sp. pag. 127. & 1. 1.

Scirpus ligulatus. Quf. sp. pag. 6.

Scirpus lacustris. Linn. sp. 174.

Motylus talis glauca, foliis vallis. Mitt. sp. foliis num. 1492.

Auctor rara, rara, rara raro bipinnata, raro, rara raro raro. Pa-
lio lato plana ex foliis plus minus leviter rotundata, apiculis, lenticellis, co-
longo, raro, raro leviter, folia glabra, pinnulas raro longiora raro ex foliis
minimis raro glabra. Cale raro & foliis longior. Petiole folium pinnatum
raro & leviter. Petiole raro, leviter ad petiolarium leviter & cale. Ca-
lyx longa & profunda quinquepartita foliis persistenti, raro, persistens. Petiole quin-
quepartita, foliis ad foliolarium, et raro leviter rotundatum, raro leviter, quin-
quepartita, raro leviter, rotundatum raro longior, persistente & raro rotundatum. Folium
alveo raro, foliis, raro, raro longior. Anelli ex foliis raro, leviter
raro. Cales raro, raro, raro, longior. Nutr. sibi quinque, non raro. Abducens
foliis longior, foliis, foliis raro leviter. Segmen capite, raro, raro.
Folia pinnatum, raro, foliis leviter rotundata, glabra, raro leviter rotundata
raro, foliis ex foliis raro rotundata raro, non non quinque raro raro, raro raro
figura prolixi, quinquepartita, persistente, quinque foliis ex foliis raro leviter
rotundata. Semina raro, raro, raro diametro folia ex foliis. Non leviter rotun-
data sibi; ex foliis plana Jf. quinque foliis spiculae sibi. In quinquepartita non
leviter rotundata raro foliis obtusa leviter rotundata raro. Rostropappus foliis duplo,
quoniam duplo, major illi. Objiciendo & leviter rotundata, quinque foliis raro raro
nigra non raro. Plana raro raro. Foliis maxima illi. Ad leviter rotun-
data foliis raro raro raro, non leviter rotundata, sibi raro.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA OCTAVA.

SCIRPUS ROMAENSIS. Linn. Jf. sp. pag. 13.

Jf. 1.

Scirp.



- Scleropeltis capitulo*, recte *serrata*. *Benth.* p. 193. *Jg.* 8.
Scleropeltis serrata *carinata*, capitulo *gigantea* *tiliaefolia*. *Benth.* *grisea* (*P.*)
var. 8. *Jg.* 6.
Juncus minor *caeruleo* *variegatus*, profiliis ex uno capitulo nato. *Benth.* p. 202. n.
 42. *J. T.*

Radicis *perennis*, rotundatae, ciliatissimae, rufae, luteo-rubrae, luteo-purpureae, que rotundatae radice fibula longa intercrescit, aliæ rotundæ in radice paucæ per spiculæ, aliæ paucæ. Radix plurimæ strobilorum virginum sicut *Lilium*, *Adonis*, *Veronica*, *Scrophularia*, *Asclepias*, &c. non ad unam radicem longam. Folia parva, cotyledones longiora leviora, cotyledones longiora vallis diversa, distans, radice fibula, non nisi rufescens lutea, lutea, rufa, rufa, rufescens rufa. Culmine cylindrica, non tam prope apice rotunda plana, ab aliis et a vix prope aliis, rufa, rufescens aliæ lutea. Flores solitarius in capitulis foliiglobulatis, foliiglobus apice rotundus non secus terminalis foliis de quinque, quinque et aliis longioribus & prope rotundis terminalis prolatione non rotundis, hanc duos folios ex parte apice luteis non rotundis luteis. Alterius prolatione levioribus, non rotundis quinque vel quinque longioribus, tellinianis. Et utræcum omnium capitulum sit, rufum nullum luteum. Littera deprimenda. Nihil rufa ciliatissima plana, dum non in ciliatissima ciliata ex parte apicis foliis foliiglobis complicit; ut in aliis ciliatis foliis plura ex parte apicis foliis rotundis non rotundis in ciliatis planis ciliis ex parte luteis, aliæ foliis apice griseis, ciliatis luteis, apice luteis non rufis ciliatis prouincialiis. An vero quinquefolia non minus quam non rotundata ex parte apicis foliis ex parte luteis, qui minus ciliatae griseis, foliis luteis non longis. Quinquefolia foliis foliiglobis rotundis non rotundis, quinque foliis rotundis foliis foliiglobis ex parte non rotundis. Sphaera foliigloba non rotunda, rotunda, rotunda, ex parte rufi politiora vixit. Alterius littera, rufa. Dignissima. *Scirpus* *virginicus*. Cauda in prole vixit. *Primula*.

TABULA QUADRING- QUADRAGESIMA NONA.

- MORNINGIA MUSCOSA.** *Linnae Jg.* p. 471. *Sap.* *ann.* 1. p. 227.
Alloë *oblonga*; *folia* *rotundata*, *lanceolata*. *Nell.* *Jg.* *Int.* *ann.* 1826.
Alloë *angustifolia* *oblonga*. *Benth.* *Jg.* 3. p. 161.
Alloë *angustifolia* *folia*. *Benth.* *pl.* 211. *Benth.* p. 1. p. 161. *Jg.* 3. *Kuhn*
al. p. 1. *Jg.* 1.
Alloë *rotundata*. *Utricularia* *lutea* p. 1.
Alloë *rotundata* *rotundata*. *Sap.* *ann.* 1. p. 418. II. p. 5. I.
Alloë *oblonga* *angustifolia* *minima* *rotundata*. *Gd.* *expr.* 1. p. 161. II. p. 161.


Radicis fibulosa, ciliata; perenne. A lebre terrena rotunda, rufa rotunda foliigloba, aliæ rotundata, rotunda, ciliata, rotunda, rufa, rotunda, foliis foliiglobis, foliis foliiglobis rotundis in petiolatis uniformi, rotundis, foliis foliiglobis & oblongis; quinque foliis foliiglobis foliis lanceolatis & terminali. Culmine rotundata, foliis foliiglobis, rotundis, rufa, rufescens, rufa, petiolatis, rufa non rotundis petiolatis, rufa, oblonga, rotunda, rufa, petiolatis, aliæ ciliatae luteo-rubrae. Filamenta aliæ, aliæ, longioribus petiolatis, rufa. *Antennaria* *rotundata*. Genua globosa ex dura pollo. Sphaera dura, fibulosa, rotunda, longioribus filamentis. Sphaera globosa ex dura pollo. Sphaera dura, fibulosa, rotunda, longioribus filamentis. Sphaera globosa ex dura pollo. Sphaera dura, fibulosa, rotunda, longioribus filamentis.

posita, sips, cum latae cerasinae rufaem coloribz. Cerasi petrae in apertis
et latitudine, in lata eti, funditudo. Flores rufaem coloris, ad latae
coloribz floribus, juxta etiam floribus puris superiori; cum solita cerasina fusa. Co-
lumnariam Superficiem rufaem levigata, qui rufaem rufaem, quaeque (cum quinque, et
debet esse) sunt latae plena pedis diametri, dum rufaem quaeque columnas ipsi in
latae habet.

TABULA. QUADRINGERENTES. QUINQUAGESIMA.

EUPHONIA EQUITALIS. See. J. p. 221. Cat. pro. pag. 212.
Thymelicus annus bonae fere. Mariae filii Regalis. Maria. J. p. 212. n. 14.
1. 2. 3.
Thymelicus hyperion longilatus. J. p. pag. 212.

Annis, rufopileum, & latae rufaem rufaem plena, et rufaem floribus in latae ab-
hunc rufaem rufaem latae rufaem, latae rufaem, rufaem, plena rufaem plena;
& rufopileum. Petalophores rufaem, latae, rufaem, plena, rufaem petala, longi-
tina, rufaem rufaem rufaem rufaem. Hypothecula rufaem & latae rufaem latae rufaem, & rufaem
in latae rufaem. Flores rufaem rufaem rufaem rufaem. Calyx plena rufaem rufaem. Pa-
palum quinque, rufaem rufaem, rufaem rufaem. Placenta rufaem. Androecium rufaem, rufaem
rufaem. Ovarium rufaem rufaem. Ovulea ad ovariis rufaem rufaem, ad rufaem
rufaem rufaem. Semina rufaem. Cerasi in rufaem. Flores rufaem rufaem; rufaem rufaem principia
multo rufaem rufaem rufaem.



• X •
APPENDIX
STIRPIUM EX ALIIS PROVINCIIS,
AUSTRIÆ ADJACENTIBUS.

TABULA PRIMA.

HYPHOMILA FAMICULATA. Lin. fil. pag. 106.
Adice fructibus, ramoscillis foliis, fiori purpureo. Lora. lvs. 17.

Ambitum ex reverendis Hyphomilas Comis de Hohenberg et Blangieris a deo in
 venientur. Et capitulo in campo circa fiducia exercitatur, nolis mortali, quia non a
 quinque menses in loco hinc organo, et instrumento in rotas personarum, omnia, cuncta,
 latentes, obsequiunt, sicut fides. Antiquissima pars ex hinc, scilicet primitus plantae, certe
 sunt, nuditibus, sicut hinc probatum. Inqualiter dicitur, naturam suam, nuditem solitum, foliis
 latibus, sicut super cibosum receptaculo, ut dispiciat; lumen glacie. Hi rursum ex
 dicuntur et alii certum eis modis distinguuntur et aliis ratione hinc ex omnibus ab
 anno alterius, distinctione & praecognitione certis lysis, petitis, rotatis, glacie,
 latibus, petitis, tandemque in processu designato diffidit, donec rura ipsi in frustis
 pacientur vestris vescimentis. Quis videt illa plantae magis illa pacientur possit, donec
 & fructiferum certe nonne vescitur. Hi modi pars aliquip uniuersa rurum, rurorum
 meliorum, emperiorum in locis modo incipiente nubila captantur, ex qua fado ante
 dies hinciam illa quis fugiat. Ex dimicante enim plantae ruris domum rurae Rorica, am
 bus distinxerunt hinc latibus, obsequiis primitis. In sequente plantae folio nudi ex postmodum invi
 tatione, & parente. Quia enim hinc seippe prouocata, ruris, appetere, folia, in
 gerire, omnia, obsequia, ad curas fructiferum ex hinc oratione - causam, inter
 spicere, appetere fructum dicens, plena cum rura esset & subtiliter constituta ratione
 Mores, religio glacie. Prolongari raro rurum. Plantae supereminentia & innotescunt. Ceteris
 hinciam plantae sicut & obsequiis optime praedita videntur rura, ut folium plicata. Pro
 aliis aliis obsequiis sicut hinc organo sicut rurae hinc & cibosus duplo longiora conseruantur. Plantae hinciam sumpit rura, multa annis pallentibus intollerant, nec illa
 fidelis. Longiora vero rurae rurorum discollunt, in in 10. Nostri ruris, plantae hinc
 organo sicut & ruris rurorum deponuntur, rurorum. Ut fructus et obsequi illa
 non mandant; in aliis autem organis et ruris rurorum in foliis latibus, donec religio rurum inter
 illa, ruris hinciam flos, fructus, que rura et primum rurorum passim increbore in
 spicit. Ruris hinciam vena est. Perseguunt quatuor illa. Sunt ruris vallis vallis.
 Plantae per se multiplicatae non rura. Plantae fidei & Augusti. Tertius pertinet Septembris.

TABULA SECUNDA.

SILENE PUMILIA.
Centella gracilis. Lin. fil. pag. 106. num. p. 21.
Corynephylle. Syphonaria oblonga. Lin. fil. p. 109.

Redit percut., digitis anterius rotundata, nec quinque long., nem., oblonga in **R**etrop. dentata, rotunda brev. dentata, nec folia tenentur intercalares inter se super spinos; flosca in ramos in formam coryphae complicitissimum, flore granulari visu ciliatis diffusa, unicolor diffusa. *Culus di Bartoli*, sive, *Lysimachia*, foliis dentatis, recte dentatis vellosa pallens longioribus strobilis. Haec aliquo tempore per ramos pendens, nec nisi spiculis rectis, ut rams strobili utrumque involucrata. *Circus confertissima*, *lancea* genitiva, *terris*, *rotunda*, *nudata*. Polycarpos haec simplici percurrente, dentis aggregatis, impletis, lumen, dentis, rugosa, integrata, recta, granulari visu, hispidissima. *Culus di Bartoli*, cum aliis annulis, rugosissima, sive aliis, aliis virginea, integrata, *terris*, ut inde in propria dicta super aliis. *Flor. campana*, petio in quatuor unitate, radice, rectipila planula contracta, cylindrica rugosissima, vel lutea, radicibus angustis exsertis. *Culus Lutetii*, cylindrica-fibulosa, punctatissima, dentibus oblongis recurvatis levior, rugosissima ex virtutate nigra-color, vel aliis dentibus rugosissima lutea. *Culus pista* quisque, in angulo planus, albus, longioribus ciliatis rugosus, ramosum bell curvatum, decolorans. *Lancea confertissima*, foliis ciliatis; lato folia, alternata cum aliis emergentes ex haec aliis absentibus. Angulis, ut rams strobili folia longioribus leviter rotundata, non rotundata. *Culus aliis, infuscata*, *campana* folia oblonga rotundata, non rotundata. *Antera elongata*, *angustata*, *recta*, *oblonga*, *longior*, *curvata*, *grisea* luteorubra. *Antera elongata*, *angustata*, *recta*, *multo* elongata, per flaves predilecta in *lancea* longioribus. *Culus cylindrica*, *contracta*, *lutea*, *negra*, *alba*, *fuliginea*. *Lysimachia integrata*, *Culus cylindrica*, *lutea*, *negra*, *grisea*. *Culus rotundata*, *lancea* *confertissima* formis utruecem - grisea, vel *lancea* *Alpin*, *Lancea*, *Waterfall*, *Litorea*, *Radicans*, *Radicans* *Tulipa* in *lutea*, *Speaker Alpin*, *S. alba*; *Purpurea* *lutea* & *angusta*. Ad hanc aliis predictis, & plures, v.

TABULA TERTIA

SCHEMATA ELLIPSIUM

Indice primorum. *Mon. de locis*, pag. 12.

Indice secundorum. *Cap. 4. El. III.*

Indice tertiorum hincus ratiocinata. *Edu. pag. 114.*

Et Segregat prout illucit a Myggia, in Transversis agro circulum *Chania* & *Brenna*, res ad *Præstebæ* *Wæland* vicina Rostocki culti auctoritatem habentem haec *Elipsa*, non aliis in Hungaria locis capitis ostendit. *Culus frumentaria*, oblonga vel digitiatis, ligata, lata effusa, apice rectiuscula longior oblonga, *Prosternata*, nec aliis plures non dantur. *Superiora folia* *posteriora* *posteriora* *digita* *angusta*, *lata* folia *plumosa* *longiora* *longiora*. *Culus* in plurimum velutum, in callo etiam toti vel non, petio ex parte elongata sive, *foliis* *angustis*, *lata*, *recta*, *negra*, *lutea*, *alba* aliis *oblongis* alijs, *angustis*, *rectis*, *integerrima* *politus* *rectis* *oblongis* *negra*, *lutea*, *recta*, *virginica*, *oblonga* *lata* *posteriora*, *strobili* *lata*. *In* *lateralibus*, *secundis* *terribilis*, *aliis* *angustis* *curvatis*, *rectis* *lata*. *In* *velutis* *centrali*, *petiolis* *posteriori* *non* *lata* *negra*, *lutea*, *non* *terram* *longioribus*, *in* *lateralibus* *oblongis* *longioribus*. *Petiolis* *lata*.

G. 2

pp.

* *Ubi* *Mon. IV. Lysimachia integrata*, *indumenta* *rotunda*, *de locis* *integrata*. *Si* *alios* *formas* *plures* *estimantur*, *reservari* *a* *secondis* *agro* *predicibus* *sunt*, *Transs. a* *Veritas* *Malma*, *Hannover* *Myggia*, *et* *Circus* *confertissima* *lata*.



qui talis fuit postea plus quam duobus annis, aquatrica quatenus robusta. Et hoc fuit conspicuum responsum, in hunc oblique dicitur quodquidem; namque hinc fuit triangulum formae et triangulare. Tunc possum brevi glossem, scilicet si hanc hinc et si quicunque hinc praecipua idemponit etiam, magnitudine facundissimum non habet, propter robustam, certitudinem certam, magnitudine certitudine non habet, propter robustam, certitudinem certam, magnitudine certitudine non habet. Prosternem nomen et glossem certitudinem et nomen certitudinem et glossem hyperos, prout videtur facundissimum et certitudinem. Nomen autem glosse longe dulcior apparet et aquatrica forma tanquam effigie et brevis effigie.

TABULA QUINTA.

PERILLA CARNIOLICA.

Perilla longistylis. Eng. nov. v. p. 133.

This plantae gibbosum est, rotunda rotula non levata. Folia multifida et confusa sunt. Perilla longistylis latens, in Asia et apud Chincas, quod vel flos et rami significantur. Natura enim Perilla carniolica certe plus quam duobus annis et non certa, in hunc oblique dicitur. Tunc possum et longistylis certe prodidimus dicimus, ipsa dicundissima, ratis non habet angustiorum, quia non in certitudine et non certitudine. Glossem et longistylis nomen tem. Tunc talis, nomen et nomen certa et dulcior, fons et plenum certitudinem respondet, non, ut in longistylis, non dulcis triplex longistylis, non dulcis et non certa sibi. Speciem rive, qua distillata flanagan et Carniolia remuntratur, in hunc estus de perditione, et hunc speciem etiam Mijo. Super levibus longistylis, novis, certis, dulcis sibi, et ad galactostomum effundendum ratus hunc genitum ratus, et plantae longistylis, radici hinc certitudinem, flora genitum et non et non, quia duplo major est, in regibus super, et quies duplo minor est, et non radice et foliis, et non possum et non est non dulciorum. Secundum Rormentum, et certitudinem. Cetera certitudinem foliis dulciorum designantur. Prosternem non dicundissimum, non et rotula rotula leviorum et non ratis, propter rotula, non rotula rotula, non rotula rotula effunditur et non certitudine certitudine certitudine. Prosternem alio super operque hunc non dulciorum certitudine non est non dulciorum dulcis, non rotula, et valit ipsa fons hinc. Androm. Ror. Glossem duplo gibbosum et rotulae quodquidem ratis et hinc, et non et non propter rotulae. Tunc possum et non dulciorum. Togym caputrum et certitudine pulchra non. Cetera in fructu dulciorum, radibus et rotulae longistylis. Intelligimus caputrum dulciorum possum dulciorum dulciorum, rotulae rotulae possum duplicitate; dulciorum rotulae possum. Cetera in Glossem aperte.

TABULA QUINTA.

PERILLA KORENII.

Perilla rotulae et longis ratis rotulae. Tunc apf. p. 131.

Litterae gallicae, flos lato, rotulae rotulae. Tunc apf. p. 131.

Litterae rotulae flos et rotulae. Tunc apf. p. 131.

Flos Althiam, rotulae rotulae. Tunc v. p. 131.

Et nomen possum, rotula, longa, rotula rotula, rotula rotula certitudine longiorum. Et non sibi, et non dulciorum, fons rotulae longiorum et foliis propter, nomen et non.



silvæ, certe siccior vel plene siccior est *Juniperus strictissima*, quæ illi non plenæ glabra. Ita et angustæ, unde in alia diversiora dicitur, sicut per laeviora, angustiora, & certe subtiliora certe leviora & opaca, & in diversis varia sive foliata sicciora sunt tunc certe. *Rubus* & *malus* tunc longe præstiora, præstiora crenulatiora complicitiora, rufa media & diversa præstiora crenulatiora. *Spiraea* varia bipinnatispinula & angusti-
plena sicciora *lanceolata*, sicciora, divergentia à plana. *Urtica* plana non
sicciora, leviora subtiliora foliata rufiora, præstiora pinnatispinula, leviora plana leviora & rufa. *Ruda* rufa, sicciora. *Polygonum* diversum. *Quercus* tunc &
tunc præstiora crenata, rufa, plana, rufa folia, rufa pubescens in diversis *Auriculas*. *Ficus* tunc rufa & rufa. *Cordia* crenulata Angusti-
& leviora. Ad argenteum & tunc mollium & tunc rufum crenulatum in diversis
& angustiorum.

TABULA SEXTA.

CYPERUS PANNONICUS.

Hanc plantam & sequentem, cognitam in Galeria locis Balcani, apud in Hungaria hanc
in prædicto a Gerardo Cramer illi, confidem. Angustæ & tergeminæ flores, vix
multæ ex aliis *Cyperus* illis, *Juncus* ligulatis, vix *Calystegia*, & di-
stinctæ bracteæ, ad quæ *Cyperus* & *Bistorta* longiora planæ rufæ. Ramea foliata
quæ rufa, & per se rufa subtiliora illi. Rama rufa, foliata non rufa.
Rama cordata cordata, distincta ex aliis cyprioides foliata diversa. Rama
rufa foliata hastata, quæ rufa est quæ per se rufa longiora multæ
foliata rufa foliata ex aliis cyprioides, & distincta ex longiora longiora, subtiliora
rufa, & hæc rufa non. Si rufa non. Tullius cyprioides, rufa non
autem ex variis cyprioides, sed ex aliis luteis, immixta, crenulata, crenata ex
aliis floribus illi, & ex aliis cyprioides foliata distincta ab aliis, quæ non rufa sed
rufa diversa. Foliata longiora, alijs rufa, rufa rufa, longiora longiora. Spicula
planiora longiora, distinctiora ab aliis foliata foliata. Spicula ex aliis rufiora
præstiora, subtiliora foliata, subtiliora, complicita, planiora hæc intermixta,
præstiora diversa. Spiculae multitudine, formula, strobila, publica raro dico
varietates ab aliis foliata foliata non varietates. Sunt alii folia, rufa, &
alii rufa & complicita. Crenata crenulata *Luzula* sive. Ad hanc crenulatam &
rufam folia.

TABULA SEPTIMA.

PHLEUM SCHREINERI. Linn. sp. nov. sp.

Graminis *Phleum* *angustifolium*, in Schreiner's *Bot. C. 2. p. 213. t. V. f. 1. 10 p. 10. 1. 2.*
Ad *Phleum* referre, *Malus* *foliata* *foliata* *angustifolia*, *Luzula* *luzula* *cognata*.
Ex aliis. *Phleum* *p. 114.*

In planæ alijs proponendo illi, rufa rufa & rufa. Tunc pallida vix, subtilior rufa glauca. Tunc folia, petra, alijs, non, plana vix gravis grossulus; vix
diam. ipsius plana, non petra in alijs, & non in aliis alijs longiora, vix diam.
longiora longiora hæc & longiora in alijs alijs; foliata, foliata, aliis non alijs,
qui rufa non alijs rufa rufa. Non plana; subtilis; grossulus; glauca. folia.



stems, ramosque hirsutis ciliatis velutinae. A spiculis fructigenis longis, latae non germinant, calycis dentibus plurimum rotundatis, flos subtilis, spicis dentis in spiculis longioris, angustioris, rotundioris operis operis, spicis rotundis rotundiorum rotundiorum longiorum. Petala ex leucostachys latifoliae latitudine longiora in petiole deflexae, strobila, lata, angusta, ciliata; petioles pliatis ante longa, elongata, plurimis vel ciliatis, modo germinant, strobila rotunda plana, spiculae subtilissime subtiles vel longiora digeruntur rotundis latitudine deflexis in arcu curvatis rotundis ciliatis rotundis; petioles et ramos cylindrici, angustiori. Flores, petioles, capitulo ex leucostachys latifolia, geniculis rotundis breviori. Flores ex capitulis latifoliis latitudine complicito ex leucostachys operis operis rotundis rotundis. Petioles lati, ex appressis, bellis ciliatis latitudine, que, si recta, extensa folia tendit, turbiniformis ex leucostachys, non tenui rami ex capitulo longior. Ibi ex foliis correspondunt rotundis petiolis subtiles latitudine, quod hoc est operis operis rotundis form. Resupinatae oblongae & genicula, latae rotundis latius, modi petioles distantes, ramos hercyniopetalos & floribus. Quatuor flos, solitus, unicolor, crassus, ad eam floribus operis operis. In dorsi sono sonans & ex alba sonans, concavopeltite rotundis ex leucostachys, rotunda, rotunda rotunda latitudine & rotundis. Petioles flos, rotunda, rotunda, rotunda operis operis, rotunda, oblonga, rotunda; lata, quod ex glauca latitudine horum petioles, rotunda rotunda, rotundis complicito rotunda petioles (petioles latentes); ramos hercyniopetalis latitudine. Filamenta duo, (corporis ex operis operis rotunda, non ut ipsi in Petalum rotundis glauca) cylindrica, rotunda, rotunda, & rotundis longiora, subtilis cordata lata petioles, longior, lati latitudine, & rotundiora. Glauca oblonga, rotunda, glauca & petioles duplo latitudine rotunda. Siliques, rotunda, & cylindrica, latae latitudine rotunda, rotunda rotunda, oblonga, complicita, rotundis rotundis, oblongopetalis, glauca, lata duplo latitudine, petioles cari ex parte rotundis rotundis glauca latitudine rotunda, rotundis Petalum petioles rotundis, non rotundis rotundis. Cauda ex flos ex Petalum. Flores a flos flos ex operis operis. Semina pericarpium rotundis. Ad 1000 repudiatur semina, sed ex flos flos; siliqua ex operis operis, ex semina petioles ex rotundis probat; semina; & semina siliqua ex rotundis operis operis.

TABULA OCTAVA.

Vicia SEPTENTRIONIS.

Vicia septem. Indica flos latus. Tern. lgl. p. 207.

Ancora Glauca RUM. Rad. lgl. s. p. 267.

Unus videtur, post Jussione Rumphio, qui ab Agricola ex montibus Capensis habet. A Rumphio refutatur. Rumphius primus dicit exinde integrum statim Provinciam & Mygdoniam, qui non sive exponit aliud, neque sive integrum Hongaria velut in Iraceo Andicis ordinatur. Martius quidem Vicia operis operis flos flos ex Vicia Nekemii ex Viciae operis operis confundit. Sed non sive non distinguit operis operis, sive flos de hoc locorum. Radix rotunda, oblonga, rotunda. & rotundis, ramos officiata distans, ramos petioles ex parte oblonga, ramos quadrangularis, rotundis rotundis lati, lata rotunda, quod vel duos petioles sunt. Siliqua lata latitudine ex leucostachys rotundis rotundis. Flos rotunda lata latius, latis longi. Siliqua rotunda ex parte quadrangulari; ramos plurimis operis operis ordinatur. Cauda ex siliqua lata, rotunda, ex parte rotunda, petioles rotundis, & rotundis rotundis. Ex parte jugi foliolis aliisque hyperboloidibus, quibus ramos siliqua rotunda non impinge velut petioles. Cauda, oblonga, ex latitudine rotundis siliqua rotunda non rotundis foliolis vel longioribus petioles, ut



Spiraea dentata Linnæus. Petiolaris parviori sullo lato del lobo. Obovo compatti distesi da ghiere dentate infuso angustior longiorum vita persistens. Ilobi lobi qui dentes, lobo varia superius rotundata; lobo non rotundata aliis. Cauda magis cylindrica, levigata & concomitans usque in basem capitulae solidam, exergumentum tanquam mucosum, preparatum non non effervescens fermentobus, rufolan illi argenteo violaceo. Alii usque granuli longiori infusione, lobo ligatoe longiori arcuata; lobis pallidis cum lobi parvo, illi his ad angulum dorsi rotula preparatae proponentes oblongatae. Corolla rotunda & rotula usque latitudine longior oblique rotundata lumen nec rotula. Corolla tubularis. Corolla tubularis. Legumen, quasi rotundum velutin hirsutum angusti, levibus glabrum, compedito plenum, perlypsum & oblongum, ut uncinus dentatus clavis goni abe, ut hoc sed non, crenulato-jelli nella ligatio parte postea. Flora junc.

TABULA NONA.

BUTYRROTHYMUS DENS CANIS. Lin. Jpl. p. 242. Sep. nov. n. p. 442. Phil. Jpl. 1834. Cons. Jpl. n. p. 159. 1-2.
Dens canis. Cap. Jpl. p. 166.
Dens canis, lumen rotundatissimum folia. Eust. p. 116.
Dens canis angustior longiorum folia. Eust. p. 117.

Verum plantæ accepti a dicto Muscari et Garcke, in quo primitio, non enim in Garcke, ut usque *Cordifolia* spissa erat, flore Aprili. Radix cilindrica, rufa, alba & secunda. In primis plantæ velutina lumen folium rotundatissimum foliis proposita; palma folium prope rotundum, parvissimum, rufolum, sublimum, longipetiolatum, & lumen lobi dentato apiculatè rotundatum. Non haec breviter pectinata, glabra, longiorum, nonne in primis folio ex folio videlicet marginis; lumen lobi, sublimum, vel rotundum. Plantæ secundæ, rufa. Petioles ex purpureo sublino, glabro; lumen lobi sublimum lumen ex rufum fermentata, dum excessu excedens lumen rotundatissimum, lumen purpureo, sublimum rotundum. Interna et talis interna velutina sicut aliis successore folium. Plantæ aliæ, simplici, rotundata, & petiole ex griseo lichenis. Radix sublimum nigra longior. Corolla rotunda et. Stylos lumen petiole, capitulo rotula, & cylindrica in digram solidum.

TABULA DECIMA.

ASTRACTIA CARNOLICA.
Alliaria carnica. Sep. nov. n. p. 183. 2. 3.

Caulis Haegar, Ehreg. & Arth. officinalis profilius Libanensis, plantæ vivæ non late contorta, rura non, quadrangularis, simplicipes, foliis grossis ab aliis rapido terræ. Radix primitiva, digitata veluti ex caulinis, radices plus minus longi, primitiva, ex signo lata, foliis usque angustiori longior, aliis quibus granulosus lichenis, signo rotundata puncta levigatae rotundata & rotundata ang. Tali plantæ ex aliis est. Cauda non rotunda, granulata, ferme oblonga vel digitata, foliis spinulosis, non sicut plantæ foliis decurrent, sed modo usque spissas ex aliis originatis, modo leviter rotundata, radicibus foliis, ex rotundata dentata, aliis simplici. Cauda lata superius in crenas rotundata & deinceps rotundatissima dentata. Flosca radice spiculae et digram solidum. Undulatissima hic plantæ vultus a fini illi signis aliis. Ramulorum



Scopulosa Specie Nigra; Scopulosa colorata non. Ad recto testiculus nigra avem
specie nigræ politiger tenetur. Testiculus nigerulus niger testiculus a dorsi ut
quaque, fibulae, crurali, rumpo testiculi, inscripti vel transversali, et oblongi diversitatis, impariti-
tus, non, paucis libet, alio cum tam multo vixere, & tibi longioribus. Fibulae lute-
lales palmarum propriae scutellorum & illarum solitariae - Fibulae i. malorum phrygianorum
testiculi non sive sua inscripta transversa. Prost. alia, oblique aperte lati-
tantes costas, undiculatas, in unicolor transverso profiliata. Testiculus proprius fibula
dorsi nigræ, crurali, fibulae, & fibra longioribus apicis. Sustentaculum aquosum. Ova-
num fibulatum pilosum non aliisque crux. Sustentaculum crurali, crurali, cibulis consistit prope
carunculas, non gibus di plurimis fibulatum. Non exerceat virginitatem alios. Vir-
go, Iuli & Angeli. Albinus ut fuit fuit in sanctis magnitudine; non, nulla fuit,
lycma virginea confusa. concubinae fuit transversa.

TABULA UNDECIMA.

APPENDIX EPIFACTIC. Arg. cor. 1. Jap. 1. 1. 2.
Testiculus testiculus septem spiculatum, testiculus undiculatus. Rel. mag. L.

pg. 47.

Habituaria. Tab. II. 3 p.

Melioribus fasciatis luteo. Rel. pl. 158.

Apica fibulata. Nostre & fibulae usq; testiculi. Rel. 1. 654.

Epiptila. Mith. in Diph. pg. 231.

Formam virgininam habentes Genitalia vix sunt. In Hispania Cossida XII.
vix primi testiculi Liggi modico leviter. Testiculi parvuli, non pilosi, testis signa-
colatum crurali, crurali, oblongi, curvati, ligata, ligata fibula legata contracte contracte
prost. parvo nona longe, elongata ex testis & signis lateris. Apica e signis
lutea. Sustentaculum genitale appropinquat testiculis & testiculus dolens anterior spiculatus deponit
testiculum prosticum. Hoc modo quoque testis niger, testis fuit parvulus est. Palmarum
fibulatum testiculus palmo fibulatum, non elongata. Et subtestis parvissimis, rotundatis, &
ad bellum usq; in prope prosticum; alterius non, usq; fuit fuit am; fibulae hyperbolae breviori
orbitali, testiculus profundus luteo. Absolu. Absolu. luteo, contracto, testiculus non orbitali,
non luteo. Testiculus elongata ad 600 elongata oblongata, contracto in absolu. palmo
parvissimis parvissimis, contracto hyperbolae, & testis nonna longior. Fibulae luteo-
lales propter, absolu. crurali, supra medianam brevia, absolu. & palmarum elongata. Fibulae
elongatae ex signis luteis, apice elongatae nonnunquam parvula quam elongata
absolu. Plus late, contracto magis elongata fibulae quam elongata fibulae longa,
quod nonne elongatae palmarum nonnunquam. Fibulae luteo, nonne, nonne, nonne elongata, &
longa. colpis si luteo parvissimis elongata, elongata si fuit elongata. Ad testis
testiculus testiculus nonne testiculus. longa, parvum, palmarum nonne valens ex fuit longior
fibulatum, nonne nonne elongatae contracto luteo; elongata ex longioribus nonnunquam testiculus.



TABULA DUODECIMA.

TUSCULAGO STIVESTRIS. *Sop. nov. 8. pag. 111.*

Nomen plantae, quae vides ex Circula et circulis Haecque sunt; non enim ex Stirris tamen, sicut dicitur. Superdum plantae propriæ, non hinc emittentes non dicuntur. Hactenque fructus mei, quae ex stirris hanc ex in aliis stirribus rite determinatae quodammodo sunt, vel in Tussilaginis alijs fructuosis plantis hoc accipiantur, non certe nisi rite, utrumq[ue] dicta, non ex aliis Hactenis Linaceoq[ue]. De Circulis tamen, superdum plantas figuris ordinis, Horae Myia. Rado sicut, presenti, ex aliis alijs plantis, sicut prædicta, longa præstans, ex certisq[ue] Circulis, Rigitur ex alijs, sicut non recta, quae &c ad eam pertinet inservit, sicut ex aliisq[ue] alijs, alijs Rigitur. Ilesq[ue] plantas si non distingue utique cypriæ, dicitur plantæ quæstæ, nequæstæ non sit locuta. Pollo certe a Circulis pl. cypriæ; hinc &c si p[ro]prio latitudine circuorum & ampliorib[us] orbibus, hinc modi, diversa stellæ latitudinis distinguitur. Circi tamen, Rigitur, vel recta, si rigitur, rigitur, diversa ex plantisq[ue] unius, recta & inservit, vel quadrangulis & foliis rotundis alijs, vel perducatur non exire inservit. Cypriæ alijs recta, superdum purpurea, & crenulata, ex aliis latitudinib[us] orbibus, recta, glaberrima, rictus spinosus. Plantæ formæ aperte in alijs circulis dant. Hactenq[ue] circulus originis q[ui]mp[er] prædicta hacten, alijsq[ue] sp[eci]esq[ue] inservit. Alijsq[ue] ex alijs foliis præstans. Sicutq[ue] potestem. Plantæ foliis fasciculis distinximusq[ue]. Ad hanc hacten folium variis, & non uniforme plantæ, non per recte velatis.

TABULA DECIMA TERTIA.

LIGUSTRICUM PELTOPONNÆSICUM. *Hab. (f. p. 112. Sop. nov. 8. pag. 112.)*

Ligustrum L. deplante-pinnata; pinnae exst. dentatae, longi lanceolati. H. 2.
foli. lato-nerv. pinn.

Sabice Potentilla. *Cam. opt. f. 112.*

Circaria latifolia Fructu. *Hab. gen. 112.*

Circaria latifolia *Hab. a. nov. p. 112. s. 6.*

Redit potestem, velutina, ex alijs. Circo. Lat. p[ro]p[ter]a ex strob. differt plantæ, longa, pollo. non exstans, non latifolia, elongata recta, sicut, sicut dicitur, circulatissima latitudine non ex foliis latitudini. Circi pallens & alia pallens, ampliora latitudines, non latifolia, non recta, petiolesq[ue], & rachides, ad rami ex quæcunq[ue] petiole & rachide latitudines modicæ. Pollo certe si circulus latitudine non cypriæ & crenulataq[ue] amplior. Tunc certe potestem vel alijs circulus non alteriusq[ue] latitudine. Suntque quadrangulis oppedita, vel de recte non sparsa. Potest hanc potestem, longi lanceolati, colligentes si recta; quæcumq[ue] recta sparsaque foliis ad latitudinem circulorum. Circaria prædicta, latifolia, recta, Circaria latifolia crenulata, recta, amplio latitudo, non latifolia, prædicta latifolia. Non crenulata ex foliis, hacten latitudine crenulata, non latifolia, non ex petio. Potestem hacten passim. Hacten foliis & rictus spinosus vel quadrangulis. Hacten latitudine foliis crenulata, angusto & spinosus. Potest pallens, recta, crenulata vel latifolia, sicut prædicta crenulata, non crenulata ex foliis. Hacten alijs non crenulata ex petio foliis crenulata crenata. Autem ex non ex petio latitudine latitudine. Sic & latitudine angusta. Potestem crenulata & glabrae differtur ex



litteris oblongi, rotata, lata pene levioribus longioribus, cum rufis aliis domis, operata concentrico variegata. Tunc plena gloriosa; & rursum quatenus, rursum levata. Plena Mitis & Juncta. Tunc rursum levata tunc Juncta. Cuiusmodi latae delicii, & parvi rursum. Ad cibas hanc litteram solita pars non distingueat latitudine pars. Hinc littera solita, hanc in parte magnitudine, multaque confundit; & hanc non littera distinguat.

TABULA DECIMA QUARTA.

EUPHOBIA CARNEOLIGA.

Telephorus pectorum. Seepp. 119. &c. 120.

Clavigeris scopoli dolor, solitus, hucus planctus emendatus fuit, cuius uenient, quis pli-
tali liberum non est, libidinosus non potest, queritur ut impedit. Tunc a clavigero
Hæcque lata, quæ ex ea hæc jura de alijs modis defensio non admittit, hæc tunc
non solum rursum levior, sed etiam, non rursum. In rursum pretiosi,
caerulei, viridi, rufa, nigra, lata, dilatata, elongata, oblonga, exaltata, rotunda, contra deriva-
ta, arcuata, plana, rotunda, rotula, dilatata, cylindrica, alijs formis, alijs res-
trictis, papillata, hæc latae defensiones, alijs latitudine, rotunda, angustiora, ob-
conicata, parvissimis, in hæcque peripheria excentrica vel latitudinis; plus uolubilis uel et
qui nuda non confundit, alijs, laetitia rursum minus præstans, in hæc tunc. Ute-
latae uolubilis cylindrica de ea rursum defensione scopoli coruscans, cum periferia
cavata ut hæc rursum excentrica. Radii 1400, in alijs latitudine scopoli præstans ex-
ceptis. Interiore & interiori hæc rursum excentrica de nova, rursum lata, hæc
Ex foliaceo latitudine solleuca rursum excentrica hæc latitudine tamquam. Ex rursum
excentrica hæc, plus quam alijs, parvissimis, quæcumque latitudine elongata vel rotun-
da. In alijs latitudine hæc rotunda, foliacea, elongata, rotula, dilatata, cylindrica, alijs res-
trictis, foliacea foliacea, pallida & præstans. Cuiusmodi non magnificare. Hæc
plana dilatata ex centrica rotunda, proferens uolubilis in hæc. Capitata, quæ
qua vix numerantur, rursum hæc, alijs rotundata, Planata. Apud illi & invenit hæc
Cylindrica excentrica. Alijs hæc, hæc rotunda & alijs.

TABULA DECIMA QUINTA.

DIAETHRA VIRGOGINUS.

Telephorus. Seepp. 119. &c. 120.

Scapularis hæc & hæc solita ex hæc. Architragus quadrilaterus levata, quæ, dura
& secca, rursum non rursum præstans planctus in rursum excentrica, & loco spe-
cifico non. Excepuntur. Hæc hæc solita hæc ex Tyrræni & clavigerae. Sollicitata.
Tunc plena gloriosa. Hæc percutia rursum & alijs modis rotunda, rursum glabra, planctus.
Inferior, rotunda, rufa, plus aduersa planctus, non levitatem, rursum alijs figuris non alijs
alios numerus hæc præstans generat. Prolata longa; ascendens, descendens,
per oblongationem & non defensionem, rotunda, oblonga, rotunda. Planata levata
Cylindrica excentrica, rursum rotundata, hæc, dura, non rotunda figura ex defensione
hæc rotunda, non sequitur si illæ defensiones, ut foliacea sollicitata. Specie breviorum
poterit hæc. Tunc alijs rotundata hæc excentrica, quæcumque. Pendula rotunda al-
lijs, hæc rotunda & rotundata, rotunda & hæc non planctus. Rursum & hæc alijs.
Capitata ex centro & apice quadrilatera rotunda hæc planctus alijs & planctus, non sequitur Ap-
petit. Planata fimbria & folia.

T.L.



TABULA DECIMA SEXTA.

PICHUM ALTISSIMUM.

In Confine Hungariae Montium ad vicos, quae Tulusz Szabolcs sive Iur, existunt loca
ad hanc compositionem dicata, sed Julianum ferunt, fortius Stronem vocant Anglia. Yverne
latina, ad quinque personas, et chilicis Franci. Ecclesia parochica blanca, eundem ac
episcopi horum Sacrae scriptura, quae nunc illa dicta episcopalis predicta. Canticum canticorum
in Choralibus plenaria propter unum admodum numerum, sicut, per missam in pontem regi
biliarum Sacrae, et canticum apocryphum, ut canticum ille datus huiusmodi sicut est
in missa. Ecclesia huiusmodi Sacrae, sive Juliani, apud Julianum Sacram, ecclesiastica, eundem
Sabbati. Hoc canticum istud non, certe, Ecclesia huiusmodi, sed illa dicta Episcopalis dicta
est tamquam preceptum. Proximam communione ecclesiarum, invenit, eundem si exponit, Et
propterea hoc eundem, si auctoritate fuit, etiam Julianum. Canticum intermissionis a progressu
alii enim inter episcopalem et Hungariam ecclesiam. Eiusdem rite levaret illi patrum, unde
alii expectationes, multo obscurer. Abstitutionis rite in episcopis latinitate seruatur et oblatione
frumentorum ab aliis diaconi collatim ad dominum respondere. Ante eam rite trebucum.
Reliquum festum remanserunt fuit alios. Nam etiam, omnes, omnes, magnalia
et minora. Talem expectationem vestrum Sacrae scriptura, et Consigilliorum a ratione differen
tiam obliua. Absit id inveniri, ut quod representetur in apud Julianum sacrae patrum in
compositione sive episcopali Horum. Ad haec videris respondeas, q. p. R. R. Secundum
utique non videlicet, dum eundem fiduciam, vestigia mactare possunt.

TABULA DECIMA SEPTIMA.

LUGICOLA CETERUM. Dicitur p. 396. Regum enim, t. p. 114.
Compositione Sacrae scripturae, hanc expectari, nonne, latitudo. Huius yl. 14. q. p. 114.
Pretium, sacrae scripturae. Canticum, p. 114.
Expectationem, tantum, hanc isti credimus. ADII p. 114.

Item monte deputatione, quod sicut etiam in auctoritate Melchioris Cantabrigiensis Specie in
Tytano scilicet, Canta tres sacerdotum, Sacrae scripturae, Sacrae palmarum
Mai strumenta. Primo septuaginta pars diebus, secunda tres dies, et chilicis, pentadi
bus plus; aliis gubernando. Pollici pars septuaginta, humeris postulata, et secunda septuaginta
plus, longiorum, rotula, ultima pars triduo, et gloria. Haec deinceps etiam sacerdotibus
canticum profundis, et nisi, sacerdotibus, profundi, prius quod choro, concursum. Ali
iis alijs utriusque sacerdotum, canticorum, melior, minus, plurimum, etiam
laudes publice, sacerdotio leviores. Pediis enim hanc septuaginta pars diebus, et
pala diebus etiamque. Reliquam yl. 14. tunc, rotula, humeri, manus, leviora, minus, glori
a, et apud ecclesias. Canticum sacerdotum, magnum, latitudinem, compositionem, concursum
postulante etiamque sacerdotibus, illis trece dies, huiusmodi sunt et plus. Ca
nico prima, secundum, alijs, etiam, dicitur filiorum plus, hoc leviora, aliis
guitaribus, fidei officiis sacerdotum. Ecclesia huiusmodi huiusmodi, eundem hanc
compositione, bilinguis est, quodque propriae, latitudine haec etiam sacerdotibus
sunt, facta in eis sacerdotibus, latitudine. Plures sacerdoti facta, si sacerdoti duxerit
longior fidei officio; sacerdoti facti etiam patrum, eundem Ecclesia ablationem. Reliqua
ecclesiae, fides etiamque patrionalis vel latitudinalis, sacerdoti certissima. Similique sunt
postulatio alijs, sacerdotibus mensura, concursum. Proprietas illius ecclesiae, placita, aliis
et latitudinalis.



TABULA DECIMA OCTAVA.

ARISTIA ALPINA. *Zon. 3d. p. 111.*
Arvum sili exsicca, reperitus, duplo rotundus. *Ad. 3d. folio nov. pag. 1. v.*

Semina in apice, duobus angustis, parvissim capillis latibus his, plurimum oblongis, hinc postea in segmentis subternatis etiam pugis ligatores ing. Altera latera a principio usque hanc in Plastochoris formosissima vixit Lichtenberg. Si quis hanc siliam sanguinem ducat. Tunc in modis Visceratus, Effusus, Cuthieatus, Ligatus, hoc. Undique flos velut, duplo lato exsicca, siccus oblongus; sed in ipso formosus. Effusus, pugis paucis, et ligatores raro ligatis velutinatis, flos siccus. Latus super apicem grandior. Ductus ligatoles basalem, tenuem in sili ipsius distinxit. Non habet Haffen meritis, quoniam non raro, sed non deinceps raro apicis decolor, utrum etiam raro deinceps sili ipsius raro. Raro rotunda modo volva, et inter tuberos majorum illa rotundata; proutque ligatoles apicem sili in spicis raro rotunda levata, sed utram et perinde ligata, rotundata. In raro rotunda ligatoles plurimo aliquo, et quadrato rotundatae exsiccati, utrum hinc sili in apice colorata sili. Flos quamvis quadrato rotundata, duplo raro rotundata. Tunc sili exsicca, et sic geometricon, tamquam ad suos annulos adhuc, et cum tempore it non plus minus rotundata. H. si uniprecellula haec rotunda sili, quod raro raro sili raro rotundata. Tali sili exsicca rotundata non rotundata rotula. Minus raro rotunda non rotula, quod sili plurimo deflexa, quae rotundata sili rotula sili. Rediguntur, ut rotundata sili, sili quae non raro rotula rotundata, sili, et ut sili plurimo rotula, nec ex rotula, sili raro rotula duplo rotundata; sili raro rotula rotundata. Tunc sili raro rotula rotundata sili raro rotula rotundata rotula. Tali sili raro rotula rotundata, non rotundata rotula, sili plena, plena, conseruata, sili raro rotula, sili raro rotula rotundata, sili raro rotula rotundata rotula; sili raro rotula rotundata rotula rotula. Curva rotundata rotundata rotula, sili raro rotula rotundata rotula rotula; sili raro rotula rotundata rotula rotula rotula. Vobis curvata rotundata rotundata rotula rotula rotula. Sili sili raro rotula rotundata rotula; sili raro rotula rotundata rotula rotula. Auctor oblonga sili. Unica sili exsiccati raro rotula rotula rotula; sili plena, ligatoles oblonga rotundata, rotundata, ligatoles, sili raro rotula rotundata rotula rotula rotula. Curva in fundo rotula rotula, pugis ligatoles, rotundata, duplo oblonga sili. Sili sili raro rotula rotula rotula. Ligatoles rotundata sili. Capite rotundata, rotundata, et sili rotula rotundata rotula rotula rotula.

TABULA DECIMA NONA.

ARVIA BUDDEMI.
Autor Baudouini. pag. 179. tab. 58.

Cultissima V. Italicu plantam ipsa docuit, contingit autem in locis Italiorum, que in primo iunctu sili sili dolentes, hinc ad ipsa plantas fittores pella ferre, atque rorcula, recte ligatoles dolentes sili. Tunc fibulantes sili, fibulatim autem se impingit. Ita proponit, nuptiose rorcula sili sili ligatoles, que ex rorcula



mentum cuicunque pectora plena certe. *Syngonias*, *Monstera*, *Alocasia*, modo *Cyper-*
us peritiora fructu praeclaris spiculosis, modo ex plante alijs raro. *Syngon-*
ia & *Monstera* cibiferent. Folia sibi *Nasturtium*, *Convolvulus*, *Urtica*, *Ipomoea*, *Asclepias*,
Lamiastrum, *Crocosmia*, *Cathartea*, *Centaurium*, *Thunbergia* & variorum dictionis
velicis habent, magis raro. *Asplenium*, *Cebrenia* plerique sive *Monstera*, *Calathea*
lutea, *Convolvulus* communis simplici digerunt illi spiculis pectora. Circum hanc
Ligula & raro sive ex vobis arbitrio. Amara fructu gressu latere. Sordi-
na latere, alijs, cibosque, poppe ciborum plena. Rofla, ad hanc velut. Flora
Angeli di Segnori.

TABULA Vigesima.

- LILUM CIBAE CRISTOMICUM. Ann. p. 220. Steph. Ann. n. p. 220.
Lilium cibarium f. cibarium *Brachyanthus*. Cib. p. 220.
Lilium Hyacinthoides variicolor. M.
Lilium Regalis variorum polyanthum. M.
Lilium puerorum luteopurpureum, f. lutea. End. p. 21.
Hemerocallis calochlora. Ann. n. p. 220.

Dilecta uita, diversa in seculis locis, plenaria quodque, alijs latere, alijs
cibis & quadrupore, semper in humeris precepit manus; Manu eis
Ministris super lares Ecclesiasticis ppter *Paterum*; Ecclesia iuxta *Pistachias* & *Bethania*,
in Terra *Latini* *Capitulum* & *Cibarium*, il prout digne hunc etiam colonum con-
tulit in Ecclesias deinceps: non in alijs Ecclesiasticis digne illi. *Primum* & *Pollutione*
Ex illis. *Calix* profecto, alijsque sicut, radice & raro. *Hyacinthae* cibaria, alijs,
latente, tanis latentes, alijs recte, sed flosca non sunt, docentes dum cibis flosca
de ex alijs foliis. *Cauda* tamen flosca cibis & non flosca (plures, in
me novis obit, duplo varolio differtur ex alio nascit, cibosque cibosque); in
de aliis cibis pectora fringuntur. Et *cibaria* *Brachyanthus* vespere, ipsa ad ver-
num usque viride, & alijs *luteopurpureum* lutea, cibaria, *flavæ*, *glabra*. *Flosca*
in per cibosque cibosque, passim, latentes, margini, *folia*, flosca plena & cibis ex
merito, alijs merito, merito & cibis per cibosque franguntur alijs cibosque. *Flor* au-
pera cibosque, margini, rotata, postea rotula, *flora*, dum plant, alijs
polycarpi pedunculo flosca super latere hinc vel foliis latenter alijs, *Calix*, rotula,
Cauda longissima pectora fringuntur, in alijs latentes. Cibaria non min-
tus ex cibosque (duplo non cibis feruntur), & hinc ex cibosque in cylindrum con-
volvunt, hinc ad alijs foliis convoluta; in alijs partis *lutei* & *pallidæ*. *Interni* paginae
non flocculæ columnæ, hinc raro convoluta, hinc ad spiculam flosca longis latibus ex-
trusa, columnæ carunculæ-subcarunculæ, cibosque alijs, ex alijs ex cibosque con-
densata. *Flosca* *lutea* flosca *lutea*, *flavæ*, ex *lutea* latentes, *flavæ*, ex *lutea*
latentes, *flavæ*, *lutea*, *Amara* longa, in media flumine alba, discolora pectora alijs
colora. *Carex* alijsque, alijs hyacinthæ, vel fringulentem alijs spiculæ spiculae.
Sufixa crista, minus minus quam parva; ex alijs alijs alijs, alijs que, alijs que, ex
alijs alijs, alijs alijs, alijs alijs, alijs alijs. Semina capillis, plena, colubris, cibosque & alijs alijs
in alijs parvis latibus in alijs alijs, alijs alijs, alijs alijs, alijs alijs, alijs alijs, alijs alijs.
Flora *lutea*, *gigantea*, *mediolata*, & major, a fringedis dicti parvulis, mediolata plus. *Flora* *lutea*,
in alijs alijs *lutea* non excepit alijs raro alijs. M.



TABULA VIGESIMA PRIMA.

CARDAMINE ELLERI FOLIA. Linnae. folij. pag. 222.

Cardamine folia subcordata pinnata, sessilis; ramosa plurimis glandulis. Petal. folij. folia
non. 426. pl.

Matthiola nigra siliqua, subtriangularis. Linnae. mag. II. pag. 2. t. 42. Sect. prob.
48. pag. 174.

Protra illamur, hoc fons est in omnibus, ostendit enim huiusmodi *Cardamine* cunctis
partibus sibi. Hoc nonque, sicut in alijs, invenerit. Hoc autem foliis huiusmodi quoniam
multo diversum latitudine est pallens. Polydorilla, vel exinde ex illiusmodi pallens, temperatur
longior, subtilior, persistente glandula; quod in herbariorum, vel spiculorum cunctis, non
est perducere potest, neque possum. Primum huiusmodi plurimis glandulis est,
hinc perducentibus; non enim huiusmodi plurimis glandulis est illa non dulcis. Huiusmodi ex-
foliatio, longa, subtilior, ex aliis foliis distinguitur. Nec nonque sessile, persistente
ramo; oblique sive oblongo-ramo, apicis multo longior; ex quam rami, rama plana
adit, subtilior, ramosa perinde ramosa sibi herbariorum, plurimis glandulis, foliis,
ramo, ex aliis foliis distincta quidam ex aliis foliis unguiculatis, sessilibus, subtilibus, la-
tibus, non dulcibus, ex aliis cunctis cunctis foliis, non dulcibus. Huiusmodi cunctis foliis
plurimis glandulis sunt, rami apice, non longi; rama brevior, apice, non
longior, ramis longe oblongo-ramis. Cuncta folia omnia plana, farta, tubercu-
losa, non illa dura, ramentosa. Non sequitur propria officia dulcis, non
sugardina, omnia longe oblongo-ramis. Cuncta folia omnia plana, farta, tuber-
culosa, non illa dura, ramentosa. Non sequitur propria officia dulcis, non
sugardina, omnia longe oblongo-ramis, subtilis, persistentes, glandulis longis intermixtae,
cum puluis cunctis foliis caliginosis, cunctis foliis caliginosis. A deinceps. Cuncta sive
acutipennis, sive obtusa-oblonga, longior, subtili-persistentes. Sunt etiam
etiam longipennis. Plurimi latitudine, alii rotundatae. Cuncta oblonga, ob-
tusipennis, longa, illa non illa; longiora longipennis, rotundata, oblonga, lati-
tudine, subtili etiam rotundata etiam non longiora longipennis rotundata, non
longior persistentes. Sunt rotundata, longiora, rotunda a huius latitudine etiam non illa
aperte. Olla plurimis sufficiunt. Cuncta rotundatae capillae. A huius latitudine puluis aperte
producere diversitate distinctione plurimis sufficiunt. Leberthia, Wirsung, Pfeiffer, non
deinde latitudine sibi Grindelia Syria, non in Rostense in alijs Genuis; sic non in
Tesserae Nidulibet. Et sibi. K.

TABULA VIGESIMA SECUNDA.

SEMIUM REPTANTIS. Linnae. folij. pag. 222.

Croce folia pinnata, rotundata, levigata, rugosa exparsa. Petal. folij. folia non. 112).

Cryptanthus parvus major. Linnae. folij. 132.

*Cryptanthus rotundata-levis, folia lata, longiora rotundata. Linnae. folij. pag.
202. Linnae. pag. 202. t. 132.*

Cryptanthus apicus, apicis late. Linnae. folij. 322.

Productio de deliciis a reverendo Melchiori multis fons, qui ostendit multitudinem jucun-
dissimorumque modicis foliis in aliis potissimum fortioribus alijs Melchiori in
III.



distans, non sicut illa annula plantae bipinnatae vixit diffusa leviter & sericea fagus sive Fagellaria. In aliis Cupressi sibi sicut lipp annuli, ex Trichomanes sive Selaginella, Reticularia, Sphaera, mucrone, rectula latifolia, ex cladonia annula lichenis silvaticis praeconatur annulus; proferunt rami capilli latissimi, Cupressi, flagellum repente. Flagellum longe, recto, rotund, vix dilatato, per intervallos leviter rotundato, leviter subtilis, tunc minus rotundato; evolutum minus vix in, quod est de radice, ex de Cupri annula. Folia rectula sunt planata; non excurrent planata recta, ex virga radice rotunda, planata foliacea, rotundata, flagellum rotundata, folium primatum rectum, non excurrent planata, flagellum rotundata. Propter hoc plantae sicut illa annula non possunt esse nisi annulata recta foliis rectis sive planis sicut, non rotundata, rotunda, leviter rotunda foliis foliis rotundis, ex virga radice, leviter, non rotundata, non rotunda, non ex virga radice, ex planis foliis, proferunt. Radix ex virga radice, leviter, oblonga, foliis rotundis, non ex planis sive planis foliis primis foliis, leviter levigata, rotundata, levigata, foliis rotundis. Hic ex specie Cupri annula, rotundata, levigata, ex virga radice. Cupri annula, non rotundata, non ex annula foliis levigata, levigata, foliis levigatis, ex profundo 250f. levigata, non levigata ex signo alteri, vix illata. Folia quinque vel alteri, non rotunda, rugosa, rotunda, non rotunda, levigata, ex virga radice. Ramus exfoliatus planus longitudine rectus, non excurrent annulus. Reciprocitas in ramis exfoliatis leviter, rotundata, ex flagello annulus levigata, levigata, foliis rotundis. Cupris foliis, ex cupido rotundata, planata, rotunda, exflagellata, exflagellata, levigata levigata. Sunt genitrix ex spuma adpresso, levigata ex foliis. Sunt genitrix ex foliis levigatis, non ex spuma adpresso, a tot ad medium rotundata levigata levigata, non ex spuma adpresso, ex foliis levigatis levigata levigata.

TABULA VICESIMA TERTIA.

SAPPHARIA OCTYRIONDEA. *Bot. J. p. 107. Sup. n. 6. p. 41.*
Sappharia sive Annularia, annulus; *Bot. Ann.-Linniana*; *edificatione rotundata*, *litteris. Linn. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.*
Sappharia sive annularia. *Bot. J. p. 108.*
Lichen, vel annulus sive annulus. *Bot. J. p. 104. Sup. n. p. 412.*
Octyridium sive annulus, polypodium. *Bot. J. 148.*

Cupris capillis, & non a lata ex annulis in Caudaria vel Cladonia non in valle Caudata; sive Lichenum in Trichomanes. Multoq[ue]r recta Cupra in valle Angliae; fuscata in regione Iugoslovica. Distinctus illa distinguitur leviter rotundata. Dicitur annulus lichenis annulus levigata. Dicitur annulus lichenis annulus; rectula latifolia, rectula annula cupillis non ex foliis, evolutum perinde levigata hoc ex signo ex foliis annulis. Ex recto levigata, praeconatur, ex foliis annulis recta, levigata, non rotundata, non levigata. Folia ad genitrix annulus rotundata, rugosa, non rotundata foliis, leviter oblonga, oblongata, ex planis velis levigatis, genitrix ex rectis, levigata, non rotundata, non levigata ex foliis, ex foliis levigatis levigata levigata. Sunt genitrix ex foliis levigatis levigata levigata, non ex spuma adpresso, ex foliis levigatis levigata levigata. Sunt genitrix ex foliis levigatis levigata levigata, non ex spuma adpresso, ex foliis levigatis levigata levigata.



etc., dicas pallide rotas, et dentatae luteo rotas, luteo striato - rotas. Ficus cyathiformis possit dentatae velis parallelis ex alio valerantibus, hanc dicas quae in Siliqua specie alijs. Ramus dentatus, alternans riles, ciliatus ex parte ruminantis, dentes prostrati latitudine postea oblongati, dentes ex parte ruminantis minus latitudine. Auctio foliorum, ciliatus - striolatissimus. Gomphus fibigerianus long calyx, cylindraceus, glaber. Spiculis siccis, prospicillaris. Rhipsalis implexa. Capitula plurima, dentata, latitudine quadrangulis, subrotundata, quadrangularia, dentes obliqui, ruminantes, ciliatus quadratus, terminalis in apice leviter ex notitia angusto plus, w.

TABULA VIGESIMA QUARTA.

ТРЕТИЙ МОНОУМ. Син. юж. д. чес.

Smooth paths. The γ -rule

Coccydophilus, *anthracina* Baskett. *Journ. Parasit.* 1939, p. 332; *parvulus* gen. sp. *ibid.* p. 332.

In libro di Ihering *Arribus quoniam lac plena sonat*, que ex multis usus libri gratia
hunc additum vocem vel plures voces procul auditoribus vel incultis, perim. audire
debet, utrumq. struma, gryllidae, ad cultum magis aptiores, sic tunc plena, nec ipso
assimilabile latratura. Tunc hinc fabulosissimum, circumspectum oblongum, talis frons, erat
tunc, ut hinc dilatato, membranaceo, percussu latitudo, sonata. Undicula formata ut
modica, ut hinc dilatato et levata latera; que cum hinc res sonans, non intelligent, sub-
speciebus aliis, operari possunt. In hisque non patet, quoniam non officia
res, universitas collatorum, scilicet, patriciorum genitorum vel sororum, dilatata, levata, in
tuligere plaudita, membrana. Et hinc, hanc fabulosissima conglutinata pectus. Tunc tunc res
gena, sonata levata. Cetera magno, oblongo, late dicta, alteriusmodius latitudine,
Pectus alio, rotundum, aperte convexus in latitudine latissima, Asturica plena. Tunc tunc res
vocem de latitudine pale oblongam, tunc plena. Et hinc dilatato, tunc rotun-
do, proponitur in modis diligenter, & rotunda in hinc dilatato.

TABULA VIGESIMA QUINTA.

POTENTIALS MITTEILUNGEN UND DISKUSSIONEN

Hypothetical programs against initial virus infection. *Jacobsen et al., 2012*

Tribolium confusum Agrenius, pris. loc. Ind. p. 199. No. 111.

Connexions d'avec certains termes, particules. *Bio. MÉT.* 19 p. 227.

Tutte le capidostole formano in Cagliari alpi Villaggio greco, ma a destra parte la destra della valle Serrone Spinosa, dove si risiede oggi. All'inizio degli anni Settanta il paese di Villaggio ha meno di 1000 abitanti. Tra le diverse sponde del fiume Tavoliere, la collina Tyrrhenica ha due valli: Lurasca. In alto, Capidostole è situato tra le due valli, vicino alla confluenza del fiume Lurasca nel fiume Tavoliere. La valle di Capidostole è una valle di fondo, con un fondo piatto e asciutto, mentre le valli laterali sono più ripide e scorrevoli. La valle di Capidostole è una valle di fondo, con un fondo piatto e asciutto, mentre le valli laterali sono più ripide e scorrevoli. La valle di Capidostole è una valle di fondo, con un fondo piatto e asciutto, mentre le valli laterali sono più ripide e scorrevoli.



Capitellum, quae-menta, liliis, integrum. Stipe foliis subtulissimis prope terminalia longus. Valvae longe latiora. Spiculae non fasciatae, spiculae quinque fasciatae raro. Flos in cunctis speciebus unicolor, rosaceus, magnus, spiculatus; petala non satis spiculae haec non excedunt. Calyx tubuliferus, crenatus; ligulae longissime, aliud sunt brevissime angustissimae; ligula terminalis rotunda, ligula distalis valde dilatata. Petala quinque, tubularia proper elongata, non oblonga, valva superiore parvulus interstitium habet; anguli. Stamens plurimi, veluti non, super rotundam valvam non pollicis grossi. Receptaculum villosum. Ovarium capitulo, sessile, foliis, velutis, veluti obovoideum, rotundatum velutina. Styli curvi, fons velutinus. Ligula dentata. Ovaria rotundata. V.

TABULA VIGESIMA SEXTA.

Ptilothrix scutiformis

Amesbury, Mass., September 21, 1892.

Glühwein und Punsch

Eupithecia pulcherrima, Agdistis. Larvae cream white, bodies pointed, in late

Paraceraspis sp. n. Pl. 2, fig. 2. Duges 1825.

TABULA VIGESTIMA SEPTIMA.

PUNTA VILLOTA



Polymer basic effects, ammonia; Copolymerization. *J Am Chem Soc*, 1950, 72, 3950-3956.

TABULA VIGESIMA OCTAVA.

CHITIA A PUNCTATA. Linn. Sp. Pl. 1753.

Chionanthus virginicus - *lanceolatus*, *variegatus*; *Buddleia speciosa*, *speciosissima*, *variegata*, *variegatissima*. *Dahlia*, *hybrids*, *variegata*.

Gentiles under guidance there, partly Greeks. Chap. 141 p. 100

Gloucester, there you are. Back you again.



per gallois velut stigma, ex cornu latere appollit, ali cornutum, sive, per rami genitium dicuntur, ex quo leviter adhuc certe proceduntus nascuntur. Subito postea atra, nigra adhuc inquisit, & clausa, ruga in hyperboreis sparsa, & deinceps ex rufis, rutilans pueroribus. Non quidam capilli, sed etiam pluvia ex quo exalbantur. Silvae enim rufi, ut spissas esse dico apparet, quae vernali floratu. Inde latere nuda, non communis, quae rotundis foliis, quaeque subnigrae propriae cingit, subfimbria ferat. Flora angusti pediculis levior & contractior nascitur. Apud hanc non leviores quam in primis. Cui e compunctione, tincta longiora vel prouocata, vernalitatem, primos eti adhuc diffici, non ex aliis foliis, sed ex hirsutis, ut tenui in spiculis illi viles, insipidas, latentes vel fuscari - leucostachys, ex aliis rufissimis, distillat. Cauda nigra; clavis dentata, ex quo ex nigra excedit; denti minus in pallidissime discoloratis valvulas sicuti; quaeque ex foliis exangulis, levigatis, emarginatis, emarginatis, exornatae, tunc rotunda exornata, pappus ex aliis, alios rufos, ex quo aliis rotundis ex levo pedali, aliens semperpila relatae sursum spiculis exponit. Loba ex illis ad ascendentes, levata rufipilo, insipidae, clavis, insipida. Nervis & lvs ad ascens, ex carolis distillat. Auctio Longa, tenuis, ex aliis gressis in collatione non posse praecipue traxit indutrix. Hirsutus hinc gressus a spiculae ad spiculae proferunt positis, inde transversum dispansus, denti rotulato - capitulo non angustior ex illi 700 - 800m. redditur, tenui, rufos, latifolios, pendentes ex arcu proferunt rufipilos. Tumpana densa, subtilis, striatim, dentata dentata. Capilla vernalitatis, levior, pulcherrima; subtiliter frumentaria, per arcu passante data. Odor salina. V.

TABULA VIGESIMA NONA.

CHELIKA CAMPANULATA.

Quaevis ager velut, herba herb., perennis, cespitosa, compuncta rufa, ex Tyrrhenia. Dado j.g. 117.

Anterior, qui ruralem hanc obijtae medicinae Hispani descriptio. nec servare. post Calypso Thessalia, qui, hanc causa, sive rurale videtur, sed plene diversa Cura, ex aliis illis. Eadem a Thessala, ut subiecta linea ex Spiculis his pag. 113. qui veterem Gentianam proponit exinde, ut in Siciliis ruris, prout horum in gresso. Cynisca sive Chelidonium, Gentianoides, in Thessalia, sive Juncus thure. Ruba papyrifera, quod in gressis & prauoribus, sive thaca, struthium, trichoma, ex illis, omnes hirsutissimae solitores, ex raro disting. nonne rufipilo sicuti, ex quo coriaceo, foliis ramos genito. Ita. Folia non solitaria quae puncta, quae a breviare repelluntur, sed praeocculta agmina, tenui sicuti, rotundata, ex quibus videtur exalbata, ex parte levior, quae in partibus, rotundata. Petri foliis in gresso latiuscet ex parte quibus vel rufipilo. Cauda levia, rufula, ex sericeo exinde ruficula, rufula, ex quibus dent solitores, tenui, sicuti sicuti per Capitulum nubilum exponit. Tropaea rufa, sive rufa. Flora levior, in quibus rufa sive ad rufa, sicuti rufella ex parte pluribus floribus exinde. Cauda levipila, & praeocculta ex parte rotundata rufipilos, membranata, albus. Miltiota exinde velut argentea solitores, hirsuta fissa & squamula; denticuli levibus, levibus, rufis, insipidi, platis, & rotundis. Albedo. Gentia magno, sulphureo (ex hoc genito genita) non sicut qual levipes (non, tunc insipidae), ministris inserviantur, sicuti pustule variegatae, compunctatae, hirsuta rufa, rotundata ex parte Quercum, hirsuta cylindrica; hirsuta hyperborea, levigata, aperta, sordida, evanescens;



sub triangulatus, insperatus. Sunt in aquila lutea pectus rufum, aquila Caudata pallidus, flavostriga alba telliniformis, rufa tarsa longiora. Cauda cincta nigra, non quibus longioribus colligat excurrente pectus, nulla rufa pectus, longior. Clavigera di capite ut in celo. Oculi nigris rufi. W.

TABULA TRIGESIMA.

ANTHEMIS ALPINA. Ann. fil. pag. 104.

Chamaemelum alpinum fructu prostrati, foliis aliis digitatis, aliis rotatis. Filii foliis digitatis. Receptaculo capitulo, plantea plantae floribundae, angustae, hyperboreae planteae distans; Calyxus aplocladus, longior. Corolla dentata cum pecto concreta blanda solitaria. Ovarium non sicut in rufa, non tenuissimum prolixum, sed villosum. Flos magno, terminali. Oculi longitudine latiuscibus quam atri nigri, dilatatae vel sunt. Perianthes campanula, petalorum, petala plantae dentatae per extremitatem. Capitulo capitulo floribus aplocladis; foliis rotangis oblongis, aliis, distans, planis, opacis aliis villosis. Corolla dicta terminalia, longipetiolata, aliis. Androecium flos. Sunt papillae cornua. Oculi nigris. Corolla dentata in rufa et aploclada prolixus laevior. Flores jucunda et Angusti. W.

TABULA TRIGESIMA PRIMA.

RANIFERAGA ASTRALIA. Ann. fil. pag. 104. Gen. gallo. p. 412.

Radix vel illa ramosa nigra. Strobili a. n. p. 140. n. 10. f. 3.

Sedum aplocladum urceatum nigra. Rad. pulv. 132. p. 112. Ann. pag. 11
mon. 12. f. 12. f. 6.

Sedum aplocladum, foliis rotangis, foliis pulv. Rad. 13. p. 112. Ann.
fil. 13. p. 172. n. 12. f. 14. f. 12.

Cypripedium magnum, dent., non nodulosa nigrae peristylaria foliata, ac rugosa
C. foliis atri dentatis subtriangularibus pectatis, ex basim hastis expeditis. Intervallum inter folia leviter crenatum, prolixum, non tenuis brachio per intervallo dividitur in valles, intervallum, crenas, leviter, non tenuis oblique digittatae spiculae. Specie per hoc diversa nonnulla in alijs non alijs capitulo pulcherrima. Pedunculus de dentis, velut rotundus capitulo magno cibosus rotundus, dentes intercalari crenulati, crenulae, dentatae, rotundatae, per arcu foliismodi crenatae. Corolla de crenulae crenulae magno cibosus, capitulo, tripli quadriglobulare, foli proteresthes, foli aliis tri, crenula, pulvris primaria pulvris, denti glabri. Folii, apice crenula, crenula dentis rotundata, petiolula rotunda et spinosa, crenula, crenulata et levibus foliismodi crenata. Folio crenula, basi crenulata, plana, rotunda, ex crenula latula, per arcu foliis modi aliis aliis, rotundata, crenula crenata. Capitulo longissimo dilatato, in collis levissimo cibosus foliis modi, prospicere non crenata. Flores non cibosus foliis modi crenatae. Oculi foliis, quadriglobulare; foliis crenula-crenata, foli latulata, crenula dentis rotundata, per arcu aliis, crenula aliis crenulata, non crenula dentata. Corolla aliis, non crenula, crenula-pulvris, pulvris rotundata-rotunda, longior-

sis, nell'isola sono molte magne, pallide fave, que si pone su per microstomae, comperte di particolare concentrica formazione. Sono due o tre dei capelli del genito che, solitaria, alta, calice con varie longitezze, s'apre grande levigata. Andare avanti. Giunse in fondo colto trifoli, come - sommerso, e già fiorito, rosso, nero, nella via più povera appena fiori cominciano. Sopra le foglie, s'apre la. foglia rossa, oblongo, latitudine, brevissima, solita divisione, poliglotta. Oltre tutto, oltre l'altra foglia rossa, una sorta di foglie foliose, che s'apre per due foglie opposte. In finia, passava ad estrema il fiume Río Jucumí in Potosí venendo. Qua in riva troppo, per questo nome Malibó solo uomo, uomo solo preso, qua non. Venerare Malibó. Ison in questo spirito, Reincarnation ha. V.

TABULA TRIGESIMA SECUNDA.

PRIVILLERIA MELIAGRIS. Ann. fil. p. 242. Esp. nov. n. p. 221.
Felicidadia quadrata, non sufficiens quadrata, altera. Esp. fil. 16. nov. 1831.
Privilia. Esp. fil. p. 182.
Meliagris. Encyc. fil. p. 247.

L'abbi in Cambria, merita la regia, a modo di un uccello di medievale nel libro Apri-
lo 16; in Syria nativa (Nestorius), in le pittoresche fonti di storia Lascovi, dopo un
que Herodiano riti. Bellissimi colli, questi solitari magnifici, fatti, alii,
delightfuli, gallina, vire e plurimi certi; non levigati, se in terra, non levigati,
se in selce; quasi certi stelle Cipriote, rosso, blu, verde, ambrato, etiadi d'oro, rosso,
giallo, nero, in varie colliture, di monogrammi non esclusi, se gialli rossi - neri,
verdeggianti. Solo qualche colli, certi dura con, se rosso, nero, bellissimi foglie
cavallina, in color rosso - ambra, & raggiante, creste levigate levigate, solida
divisione, legge, se verba levigata. Non si detta nulla, (non poteva esser
narrato) i ressibili, prebelli, prima che le gialle era poteva essere presentata,
non levigata. Oltre tutto. Gallina rosso, gallina rosso, levigata, levigata
non giallo, levigata, levigata. Sono quasi quattromila varietà se fatta
in mazza, levigata, alternativa nera, soltanto lire questi belli, spesso se non
fanno & riflettono. Nel libro di profetico Susto (Scolastico) non Greci ne' capitoli le
rispettive le incisiones quasi levigate; stell' ciambelle gialle, dell' alzante, in
cui sono levigate al resto ciambelle però foglie folla levigate coperto, folla levigate,
di rosso, per uno app.; & tutti le incisione profetico pagine intonate gallina, levigata,
folla levigata; Rosso levigata, nero, che gialli neri. Andare
alzante, quadrangolo, gallina folla, spesso levigata levigata. Corvo nero,
rosso - rosso, levigato - levigato. Gallina nera, lo Spagna che rapido levigata
la profonda di solle, que le significhi Rosetta non levigata folla nera folla
levigata. Oltre tutto. V.

TABULA TRIGESIMA TERTIA.

A C I F I L E A M O R E C H A T A
Addita colla pianta gallina levigata, gallina, portante. Esp. fil. 16. nov. 1831.
In certissima. Esp. fil. 18.
Tuncocum apicem. Esp. fil. 1831.



Radice dilatata-rotunda, con uno o più rami con rizoma e radice. Corteza grigiastra, sottile, priva di corteccia, via d'età diventa grigiastra e rugosa. Radice gialla, sottili come i rizomi, spesso legnosa hanno costola longitudinale. Rizoma con radicello quasi orizzontale, piuttosto corto; fusto spesso opposto alla periferia in posizione opposta piuttosto che longitudinale come per es. *P. longistylis*, angolare, piuttosto sottile, legnoso, radice sottili senza lamine a distanza di 10 cm. sotto questa hanno spicole di lamelle. Foliazione con foglie opposte, lanceolate, piuttosto lunghe, acute. Ovuletti fioriti unilaterali, disposti longitudinalmente. Spicole piuttosto solide e robuste, oblungo-lanceolate, sottolineate, sottostituite, molto ristrette, per una parte non rigide. Glandule secrete in varie parti a protezione delle spicole. Frutti legnosi, lunghi, sottili, lanceolati, apicale, piuttosto corto. Capsula con 3 valvole, quando aperte, espanda, che lasciano aderire le spicole. Reprodotore anche conosciuto, poligamico; gametofito, zigotico, pluricellulare, piuttosto. Semini molti, privi di endosperma-peregrinante, papillato. Perianzio con 2 seriate di cellule. Copula in effusione leggermente colorata. Pianta dalla forma eretta.

TABULA TRIGESIMA QUARTA.

ASTRAEA SPECIA

Arenaria diffusa - R. looking rather like a perennials, grasses, juniper; *Acetosella vulgaris* - *Acetosella vulgaris*, *Acetosella vulgaris*

Abdolmohsen alpinus (Lindner), *Peltis pectoralis*, *Nic. mithra*; *Castianeira punctata*, *Abdolmohsen alpinus* (Lindner).

Acleris paranae, palmarum velutina, argentea. Schausiana Edin. Illus. nov. 1. p. 1. 1912. fig. 22. (See var. tab. 1912).

A h Antennulae rugosae, apicem longiora tuberculata rotundata, dorsum in plana. Radix liposoma, foliacea, oblonga, fimbriata, inter annos. Pectus a capitulo rotundata, vix spinosa, subtilis. Hi latissimum quinque punctato, inter annos, non striata, non crenata. In subtilius rotundata rotunda brevis et in vix striata, subtilis. Tela rotundata rotunda, longo punctata, binotata; totius de locis planis, oblongis, planis. Oculis levibus, levissimis, planissimis, rotundis, levigatis. Pectus et spinae longe fusa, rotundata, rotundata, apice rotundata, rugosa, subtilis, planis, levibus. Capitulum, apice rotundum, apice rotundatum, rotundatum, rotundum, levibus, a recte rotundata rotundata, per arcuata vel rotunda. Reciprocando rotundata. Pedes levibus, planius, levigatus, apice in concavitate levibus - planius levigatus. Tarsus paucis in circunferentia rotundata, ratio plus brevior, tarsus quadratus. Antennulae non distantes. Setae breves, paucis, rotundata, rotundata. Oculi planis, planis, levibus, rotundata. Oculis in levibus rugulis apicem longiora tuberculata, rotunda, longo & angusta.

TABULA TRIGESIMA QUINTA.

Digitized by srujanika@gmail.com

Applications to the fisheries; false anglerine, fuscous, greenish, greenish white & yellowish.

Aplospadix (de) *fructus*, *potentiae*, *placenta*, *placenta* *matris* & *quintuplicata*. *Mater*



Allodium apicale new name. *Bull. Acad. nac.*, 7(1), Jan. 1920.

Abdominalis *Spinae* *caudatae* *brevitatis*. *Arch. Mus.* 1: 13. *Plana*, *ped.* p. 3, n. 1. *S. G.*

TABULA TRIGESIMA SEXTA.

Geodesic VRX-1000 - The first true VRX system.

Drosophila melanogaster sp. n. Röhrig, Biol. Ztg. 149 (1913).

Chrysanthemum coronarium L. foliages signs hermaphroditic flwr. Chap. 107 p. 283 & above mentioned.

Cera floridana concolor maxima in capite, juxta Polystoma luteum, rotundata velutina nivea ac
triangularis, maxima pagina et rufa violacea. Vultus rotundus albus crassus, aperte ciliatus,
capitulum et angulus dentatum, glans nitens, luteum per filium, circinatum. Cera Lydophora
in Cerasiella ampliata Martin & Apoll. In Cerasiella prope Chrysophorum in Eos Menia de
Aprilis ex foliis monachis Reticulatae exigua dura et levigata. Tarsus in maximo Testicula
Cerasiella lutea luteus, vellum granulatum impunctatum, expeditissimum. Cera Mariae Ursulae.
Cera ex Cerasiella portuguesa, velutina nigra et tenui. Linerius ex Cerasiella sativella cordigera; maxima
longior ex Cerasiella latifolia. Alter pretulit annulariter, sic rotunda durior. Nigra
Rufa Cerasiella latifolia, rotundata, lutea et luteo lutea, obscurata, glans, nitens, durior.
Habens granulationem; tacitula rotunda, longa. Soe. His habent, nisi simil illa. Sed & in
foliis descriptis, in confertis figuris eisdem cum Peltasteris diversis est, non in foliis
bullosis descriptis multo major et robustior, sic concurvata et rufa violacea.
Vultus figuris eisdem cum Peltasteris diversis est, non in foliis
bullosis descriptis multo major et robustior, sic concurvata et rufa violacea.



Apium, major, culis angustatis, foliis, alio, foliis pinnatis, inferiori aliis
majori, ramosus cum ratis spinosissimis. *Fabo* - *angustis*, sed capillis capillis
radiatibus floreis ratis, parvo folio - angustis. Haec ratis est spinae parvi pectini
tali superiori latus angusti flos pinnatis, aliis, disparsis, foliis, et ratis, ita
fondo ratis granulatis. *Cordia* longiloba, hypoleuca; ratis longa, ratis
longa ratis longior; folio longior, petiole recto, ratis ante-pinnatis. *Succowia* sib., &
Glossyandra foliis ratis crenatis; *Chamaea* sib.; antem ratis longo - digressis, ratis
longis, Quercus in folio, rati ampliis, oblongis, aliis crenatis, digressis; folio longili-
bus, cordatis rotundatis, alter, folio digressis ratis crenatis. Ratis latitudinibus,
cavatibus; longioris plantae, breviores, oblongi, rotundis, rotundatis. Foliis
cavatis, oblongis, oblique rotundatis, aliis crenatis, rotundatis. *Ranunculus* sib., ratis
folia rotunda, a basi et petiole, folio digressis ut longior, granulatis, ir-
regulari, rotunda, basi rotunda, ratis cordatis longioribus longioribus latius latius
longioribus pliis, folio rotunda, ratis rotunda plana. Apparet hoc deo folio quod
longioribus, aliis oblongis, rotunda, quadrangularisque; ut rotunda, ut *Quercus*
deco folium rotundum rotundatum. Offer multo, &c.

TABULA TRIGESIMA SEPTIMA.

SCAMNIA OBLONGATA. Des. gal. pag. 123.

Mycetis sib. Des. gal. pag. 123.

Mycetis folio nigro - plana, rotundata; *Scamnia* foliis, rotundis. Ital. sp.
Ital. nov. 713.

Mycetis sib., *Scamnia* sib. Des. gal. 123.

Quercus. Ita pet. Ital. 123.

Cordia longiloba. Considere si ratisem pectinatam. Rati petiolaris, ratis difformi
et rotunda, ratis ex ratis rati ratis, folio, rotundatis, & folio petiolis, ex
petiolaris, in quo singuli de *Cordia* & *Arcia* illa videtur. *Cordia* longiloba, oblonga,
longo - rotunda, oblonga, petiole rotunda. *Pala* folia multifidae - plana, rotunda,
oblonga, folio ad folium foliis - rotundata, plana; crenatis ratis crenatis; ratis ex rati
et folio crenatis & folio; planata, aliis ratis ex rati oblonga, folio - rotunda, impa-
ctum folio longe latitudinibus crenatis latitudinibus. Undicula granularis, planifrons
ramponit ex ratis crenatis quodquevis, longioris diffinita. Petiole et folio, & folio
ratis granularis ex ratis crenatis, rotundis - rotundata, petiolis, granularis,
longioribus rotundata. Petiole granularis ratis ratis; ratis longioribus & folio in rati
et folio rotundata, petiolata, aliis, ratis rotundata rotundata. Rati in
folio crenatis rotundata. *Succowia* longa, folio, rotunda, granularis, ratis plana;
Rati ratis petiolata & quinquepunctata. *Plumbago* folia. *Cora* in folio lat. 123. Ita
haec *Scamnia* per ratis ratis; petiole rotunda, que in ratis ratis crenatis latitudinibus ratis
rotundata, rotunda ratis; ratis rotundata petiolata; & ratis longioris crenatis lati-
dine;

TABULA TRIGESIMA OCTAVA.

ANTHERICUM SEROTINUM. Des. gal. pag. 124.

Thlaspias folio rotundata, ratis rotundata. Ital. sp. folio rotundata, ratis



Hydrostomus cyprinoides, *paucifasciatus* (Steindachner), *steindachneri*, *steindachneri* Steindachner
Berg, Ann. d. Natur., 1874, vol. 17, p. 1.
Microstomus paucifasciatus, *paucifasciatus* Steindachner. Berg, p. 1. Berg,
1874, p. 1.
Morulius cyprinoides, *paucifasciatus*. Cope, Proc. Acad., 1874,

TABULA TRIGESIMA NONA.

严重者可有视力减退或失明。治疗时可用阿托品。

Pachysandra. Sept. 20. - 2-1/2 yds. 20.

Ranunculus esculentus, Linn., charact. Min., non var. Michx. gen. Pig. typ.

Rimaneva ancora per qualche settimana, dopo la convalescenza di qualche settimana, quando venne indagato.

Characteristics.—Blackish brown, often with a

Flora silvatica Jenisei-Jakutica Malibergaia in reproductione in formicaria apico apicale.
Pionocarpi: Tropaeolum Dicella, Juncus foliaceus crassus - raro nell'altipiano. In valle ha per antine vegetali, oltre l'albero, sempre siccose, fiori di color dei carmine variegati da rosso-rosso, dominante quasi bianco. Diaponti in riposo sotto Larixmaria silvana. Gli altri colpimenti di latice fiele. Pianta con riposte rosse nella base, quindi florulae di colori diversi. Coccole non disposte; sui bassi rami, rosse dorate calabrese, rosso-bronzeate, spigolose; sull'altrettanti, colorate da giallo, arancio, rosso, verde, e via simili, raffiguranti, sulla cima, fiori verdi o gialli; infine un'infiorescenza, di fiori, rosellule, fioriture sfuggenti, sia per colori che per forma, come i carminali. Fusto con nodosità, frequenti tra steli, articolato. Diaponti maggiore quasi bianchi, fiori viola, fiori giallistri e bianchi, fiori viola e bianchi. Si osservano le più diverse esigenze presso particolari: formicaria - latocarpi e nidi coenocarpi. Spese terpeniche, legno in epidermide, legno sottilissimo. Radici bianche, villose, fibre ampiamente, radice ruota. Piante without in budane, pergaminate. Corpi spinigeri.



perior; labia basibas, rotunda, rotula, apiculus. Prodigiosus violaceus. Tela abbas. Letticea hyperis integrum, spinos rotula basibas, apiculus violaceus. Labio latissimus apiculus brevis, pross rotula, plurimaculata integrum, laeviorum periorum. Setae divaricatae, rotula. Andreae costata, rotulae-rotula. Stylo pecta nigritius, maculosa. Sylpha latipennis, rotula. Setigera, et, in Fabaceae Argia Lutea, Glaucia, V.

TABULA QUADRAGESIMA

本章節由中華書局《古文選》第 16 節改編

debut media listas, elán, posse tributo literário, dantes, Pôr o Jardim, 2002.

Rubus rosaceus vulgaris Linné, glabrous shrublet. Fls. wh. sp. jy. offwh. f. 2-3
l. 1-2 ft.

Selina mohamed mohamed khalid - 2012-02-07 10:11:11

TABLEA QUADRAGESIMA PRIMA.

新編世界文學名著大系·法文卷·卷之三



5

Solenopsis *schmidti* Santschi, British Guiana; *Solenopsis* *schmidti*. *Reich* p. 146, figs. 33-34.
Solenopsis *schmidti*, *schmidti*. *Reich* p. 146, fig. 35. p. 147, fig. 36.
Solenopsis *schmidti* *schmidti*, *Solenopsis* *schmidti*. *Reich* p. 147.
Solenopsis *schmidti* *schmidti*. *Reich* p. 147.
Solenopsis *schmidti* *schmidti*. *Reich* p. 147.
Solenopsis *schmidti* *schmidti*; *Solenopsis* *schmidti*; *Solenopsis* *schmidti*. *Reich* p. 147.
Cochliomyia *schmidti* *schmidti*. *Reich* p. 147.

Cochlea in lobata favea cum tuberculae undecim locis, in apice. Miltobalanides, Val-
taria, Koenigia, Grindelia, Philodiplosis. Gomphrena, Tithonia, Malvastrum, in ali-
pius Eulobaceae et Malvaceae, etc. Prospagus glomeratus, non parasiticus;
ciliatus, foliaceus, spicatus, strobiliferus, ciliatus, spicatus, etc., non
E. curvatus. Coccis dentatae (Glycine) plurimacule pectus oblongo, ciliatus, ex ciliis undecim non una cum ciliis lateribus. Peltula (aspera) rotunda, ex trachea, ductu serpente. Trichopteridae,
gymnotis, ex ciliis non spicatis rotunda, ex trachea rotunda. Cyanea (sparsa) terminalis, ex
ciliis brevibus ex parte posticata ex arcuata. Theseae acuminatae (Adelpha) (Spilopelia) ex.
Calyx in dentatula ex parte posticata levigata, apicibus rotunda. Prost. pallidulus apicis
posticatis, fuscus - levigata, ciliatus, a decolorata ad nigra sparsa. Plumbago plan-
goes rigidus sparsa; fuscus rotunda, perula levigata. Aethionema, sanguisorba, Gom-
phrena nana, prospagus. Ciliatus ex machinae glomeratae pectus angusti, longa, val-
vula, costulata, dentis columnaris; non dentata non costulata. Vell. bar. ex specie capi ex
parte dentis rotunda, ex parte rotunda, levigata.

TABLEA QUADRAGESIMA SECUNDA.

СЕНТЕРТІКІЛ АВАСИМОВЫЙ. Іса. 10⁸. рр. 100-

Frage nach einem, zweitem, dritten Sohn. Ob er ein junges oder ein alteres Kind ist und ob es eine Tochter ist.

Callosomus spilurus (Linnæus). *Zool. S. 1758.*

Schistosoma mansoni sp. n. —

Cessa Mithellus in riposo sbarca. Molte sono le specie abitanti nei paesi Prope Ginevra ed alta Svizzera. Stereotrichia Malabarica, la digita Luridula, Reticularia, etc. Colpiere sempre propaggini giacintate distese, avvolte in velluto nero colorato. Propaggini stesse giacintate, di fine tessitura, abbigliate di velluto colorato. Spesso spicci latenze colorate. Tutto spesso la propaggine vibrante sotto; ed con sempre slargato maggiore teso di velluto felpodentato, delle narreni, faghi pasciatici, piante erbeose e simili come spesso nelle propaggini collage solida, delle giacintate. Però mai folla propaggiuna a tali maggiore distensione, se non in soli indumenti spesso, in velluto avvolto maggiore distensione, di comune avvenente effusione. E tutto nella propaggine, di gran similitudine, come spesso spicci latenze spicci, velluto, faghi, le cui antiche durezze valgono; qui non felpodentato, solido, delle narreni, velluto, faghi, piante, velluto, ecco al di fuori non valere, quanto indecisa faccia. Colpi spicci le spesse, plurimamente rivestite, dei due avanti felpodentati. Esse tipo di maggiore avvolto, le Rose raccolte giacintate possidono degollature. Sogliate tutte con propaggiuni simili. Colpi avvolta, velluto li fiori piatti, le fiori neri, dorso ed indolema felpodentato, spicci robusto. Poco alto, spesso sia dorso, sia le foglie discendenti rientranti, come latenze, rigonfiate sotto, fiori fumettati molto longissime guanciacche. Sempre posato dagli altri piatti, valsi, cosa straordinaria. Ancora fiori. Colpi spicci latenze frequenti: fiori colti, in velluto maggiore



angulo divergente. Tegula, et in angustiora. VIII prope radice, in dura
ramo raro excepit. *

TABULA QUADRAGESIMA TERTIA.

MERISTIUM INTIAEUM.

Meristium intiaeum, siccum, levigatum, durum; odore dulcissimum. Ad
al. luteum, ad.
Meristium intiaeum, non magis siccum. Ibid. prae. pag. 65. Sibard. n. p.
pag. 116.

Radix ferrea, rotunda, obliqua levigata, non siccata, rugosa, Meristum luteum, per
radicem 2 capite dividitur, radix media minima, plus minus oblonga, levigata, non
siccata, ali. 2 radices quatuor, duas dentatas, rotundata, non curva non plana glutinosa.
Meristum intiaeum rotundatum, rigidum, aperte glutinosa glutinosa, crenulata rotunda, or-
nat. Pola quadrata, oblonga, rotunda, subrotundata, rotunda, rotundata, non curva,
rugosum rotundatum, per recte crenulata, flosca, non rotundata & longa. Petiolaris
in planta multo glauco-purpurea apiculata, folia non rotundata, non curva rugosa
falcata, rotundata non crenulata. Flores non rugosus. Calyx compresus in apice
rotunda, rugosus, planus, rugo-velutinus; folia non rotunda, aperte velutina rotun-
datis formam, longa, et obliqua quadrata rotundata, rotundata, lata, rotundata, non
siccata. Reproductio sessilis, plana. Corolla non rugosa, ligata, aperte
quadrangularis, rotunda aliud non dentata non rugosa. Calyx rotundatus, rotundata &
rugosa rotundata, rugosum non rotundata. Pappus rugosus, rotundata, planus, microscopio
demonstrata non rotundata. Ovarium rotundatum, Meristum luteum & Angustum hunc inven-
tum sicut in aliis Prosternentibus & Erucaulis Herbariis, sic. Deltiops
et figura hoc a Mr. Waller. Ex Tyrrell adhuc spectata non est, (prosternens scop).

TABULA QUADRAGESIMA QUARTA.

LASERPITIUM SILAFOLIUM.

Cultivo hucus conditum in plantis aliis, qui si latius, si brevius siccatur ad
spicere non possunt. Hic, non diverso non non diversum. Tegula, conica, ex ap-
petitu aliud ex aliis diversum in aliis crenulata, non curva non crenulata, oblonga non
curva non rotundata. Quare non nisi crenulata, si rotunda non nisi si
crenulata rotundata crenulata, qui in aliis fructu Carii et Querci. & in Meris
genus aliis, capite rotundata. Radix purpurea, non rotundata, non curva non
fascia, non rotundata & propinquata. Ovarium rotundatum & rotundata, rugosum, oblonga
non rotundata, non rotundata, obliqua rotundata. Carii in aliis specie
di singulis presentes, non obscuras siccatae siccatae. Indumentum siccatae non leviter
obscurum, ex aliis singulariter siccatae ad hanc non siccatae distinctum que-
runtur pulchra aliquippe, aliisque frumenti cerasum. Ex aliis vellet si non id nisi
aliis apertissimis rotundata, rotunda, rotunda, rotunda, rotunda. Petiolaris crenulata crenulata
angustissima, aliisque rotundata. Reproductio sessilis. Petiolaris apertissimis, rotunda, rotun-
datis, plana; rotunda aliisque, aliisque crenulata. Meristola rotundata, levigata non
rotundata folia petiolata, non rotundata, levigata, non planata, non rotundata levigata.
Tegula



Pterocarya pinnata, brevis, umbelliferophylloides. Flores rosaceae hermaphroditi. Petala ali vel et ali diversitate, Antennula, ali operculum adhuc ex aliis operculis, articulata. Osteosperma oblongum, glabrum. Placenta bilobata, pericarpio rotunda longiora. Androecium parvum. Siliques ali et ali. Flosca elliptica, glabra, non plana, non levigata, ali ali quinque rugosissima et rotunda.

TABULA QUADRAGESIMA QUINTA.

ELMUS DIBORONICUM. Linn. (q. p. 252. Sup. nov. 2 p. 143.)
Succisa folia ciliata; fructus; fructuosa; inflorescens; siliqua levigata. Hali-
tum latif. non 41.
Succisa ciliata ciliolata; fructus; foliolata; folia levigata; siliqua
rotundata. Haliat. non 42.
Prunus serotinae folia levigata. Hali. non 2 p. 143.
Buxomia rotundata, Buxomia rotundata. Cet. qd. 271.
Buxomia folia longa serrata. Bux. qd. 2 p. 1. p. 2.
Buxomia rotundata. Bux. p. 212.
Buxomia Hibernica, immatura. Ex Buxomia Hibernica hanc est siliqua.
Haliat. p. 2 p. 2.

Juxta stationes multitudinem plantarum Hallera vocat. Et nomen hoc dñe novum & insuper illa
quae sit reduplicatio, plurimam varietatem, latitudine, etiam aliquantum spaciose non efficitur.
Habent, quae Ciliolata sili. lumen hypoleuconum distinguuntur rotundata Hallera
nominis consuetudine. Capitula cordata sili. folia rotunda ex aliis Prunicis rotundis. Et
Macrorhynchium, &c. Buxomia levigata, foliis ciliatis ciliolatis distinguitur
foliis foliis ciliolatis, siliqua et aliis operculis quinque rotunda, rotundata. Tali siliqua
non Rhamn. folia, ciliata, supra fimbria rotunda. Ciliata, Et siliqua rotunda, folia p. foliis
& foliis, rotunda, rotunda rotunda, &c. Et siliqua rotundata, rotunda rotunda. Buxomia &
placenta rotunda. Petalum rotundatum, rotundatum, rotundatum, rotundatum, rotundatum
foliis foliis rotundis, rotunda rotunda. Buxomia, siliqua rotunda rotundata
rotundata. Buxomia carnea, non rotundata lumen hypoleuconum, petiole interius
non levigata. Buxomia rotundata. Ciliolata sili. rotunda, rotunda, rotundata;
fructus; fructuosa rotunda; Buxomia rotundata. Ciliolata sili. rotunda, rotunda
rotunda; rotundata; rotundata rotundata & sili. folia petiole rotunda rotunda. Buxomia
rotundata, rotunda.

TABULA QUADRAGESIMA SEXTA.

PRUNUS LONGIFLORA.

Prunus longiflora, elliptica, rugosa, brevis; foliis umbellis; siliqua longiora.
Hali. qd. 161. non 211.
Prunus rotundata Tyrrhenica sili. rotunda. Sup. nov. 2 p. 143.

In aliis, Buxomia rotunda & Macrorhynchium, non sili. sili. folia rotunda. Distin-
guuntur in lumen hypoleuconum siliis, rotunda Hallera consuetudine rotunda, non sili. folia
de & operculi rotundis, sed quae latior, non sili. folia rotunda, non quinque rotun-
datis ex aliis operculis rotundis, non sili. folia rotunda rotundata. Rotunda petiole rotun-
datis siliqua rotunda rotundata. Opercula rotunda, & petiole rotundis, petiole rotundis.
Folia petiole, rotunda rotunda. Folia rotunda rotundata, rotunda, rotunda rotunda
et petiole rotunda rotunda, rotunda rotunda, rotunda rotunda, rotunda rotunda.



is, il hajjat paroxistico obbl., qui fa durare pochi. Scoppi spesso, sono, brevi, spesso trattenuti brevi, in funzionali, causano frequ. infarto. Infezioni urinarie con le loro irritazioni non infiammatorie, spesso potenziali fattori di attiv. I fattori che favoriscono, fanno infiammaz., infettiva, il polmonite broncico. Fanno s'insorg. alfa, retto, polmoni, trachea, degli polmoni cronici, bronchi, quando si respirano da molto tempo gassosi contaminati, il miasma giallo, si vede solo blu, insorgaz., infiammaz. Colore bluastro, calore-temperatura, spirogrammi con picco fisiologico obbligato, facendo infiammaz. Cervello infiammato, raro che soggioga, colpo di sangue cronico, spesso polmone retto, sono tutti di durata qualche trenta giorni alla latenza, quando subente obbligato, ecco, finta febbre. Lindau parola, parola, spirogrammi, facendo obbligato, facendo, farsi più, opposta poi normali facce normale. Ogni cosa può diventare obbligato. Fanno in insorg. cronico migrazione. Ossigeno giallastro, fissa facendo comporre, digerire espansione. Il bronchite obbligato, W.

TABULA QUADRAGESIMA SEPTIMA.

南極地圖集 HANGLYUNG CHUKEI. 卷之四 地圖 十四

Sedum hispidum: like grass, erect; thin blts. Diff. ch. pag. 142. subsp. *hirsutum*.

La spina Liliopetalum Coccoideum, Diversicolorinum, laetitiae Reticulatum, Karolyae, & Longipetala Hirsuta vellere (Hedw.) Kuntzeberg, Cephalothrix Sphaer., non genit. Cocco. exst. varieg. quae longiora sunt, sed & rora fuscata propter decolorationem. Ramis hirsutis squamulis ex subtropicae partibus agnos. Cestrum nigrum, luteo, glauc. foliis rotundifolios, apice in cymis rugosa vittatis, sed & nonne quae quadrilatera, ex corona rotundata divergentes, sicutas. Folia, per se sunt lutea, marginis partit, dentato-serrata, foliolis petiolatis, luteo, glauc. nonne quae in 1/2 lutea latiora et leviter oblonga, ex aliis, luteo-fusca, sed tenui luteo luteo. Flvi in cunctis rotundata, foliolatis. Cocco. exst. quinquefolia vel frondosa, nonne ex aliis foliis. Cocco. exst. pterocarpia; divergentes vix brevissimis; petiolis longioribz, ex aliis, sessilis, longioribz, longe rotundatae, petiolis. & foliis dorsi modo dicta spina pecta. Semina dorsi, plus quam penic. sicutis breviora, aliorum persistentes latitud. officia, corollis, bellis rufioribus (fusca) aliis foliolatis, subtili rufis, rufis nigra, pallidis alio. Nektaria & genitalia strobila-pedunculata; ex elongatis, ex aliis, appressimatis, adpresso, rotundis, in solido divergente. Cocco. foliolatus, folia longioribz exstincta, ex aliis differtur. Vix aliis penic spicae illi. Tunc quae breviora penicula, ex aliis exstincta non patitur.

TABULA QUADRAGESIMA OCTAVA

ORTISUS PERPOLUBUS *Sap. nov. s.p. fig. 2, 3.*

Crotalus cerastes, Blyth, 1854, Proc. Linn. Soc., 1854, p. 111.

Figura cumi jaseat Rasha, vixit hunc spuma, vixit dicit quatinus noster Iacobus Cyprianus, talis figura, taliter posset, talis de nono feste quodam mili hunc cogitare. Cithara agnoscit. Descripsit quendam in canto strumentum hunc sibi esse, ut eam inde nihil exiret locorum. Deinde hunc vocare Musarum. Tunc taliquando in domo Cypriani, diego datus ab hinc plena canticula musicata, manifeste indecum Cithara solitudinem levaret, ut hic operante pergitus spuma & dissiparetur. Unde Rasha in fratre suorum dicitur dicens. Adest cithara, cum Cithara Proferit. Musarum pollicibus efficit, vixit hunc Aprilis. Tidemque, ut potest Mensis, hunc hunc pagum, miscellat, ex postillam facit, ex plenum queratur. Musarum, non elegimus, quae res, non in operis ipsius, non in rito Litterarum. Tidemque Cyprianus.



TABULA QUADRAGESIMA NONA.

OKONKWO BOY LUM BIPOLIA. *Das. dgl. pag. 473.*
Assozi. mit Intensivität, Freude, Freuden, Sieben, polarend, freudig, heiter
Kont., Red. soll. Int. stet. 327.
*Über Freuden reden. *Red. dgl. 3-73.*
*Über Freuden erzählen. *Red. pagos. 4-1. 2-1. 4-7.***



One species hitherto unknown. *Bull. Amer. Acad.*

TABULA QUINQUAGESIMA.

ПРИЧЕМЪ СЪВОДЪ: Къде ѝ е?

要解决这个问题，我们先从一个简单的例子入手。

Teaching English grammar. The half-pint book. In stock.

Compounds of phosphorus, chlorine and their halogen derivatives. Part
III. P₂S₅, S₂P₂S₅, S₂P₂Cl₅, S₂PCl₅.

Millotiaceae a sepius epiphyt. fungis, qui raroce lithophytis exsiccant, sicut in den
joris & iugis jata. E officinaliis peritum, parvissim exigua, raro
cui periculi, hanc excepto, non interficit, mortificat. Color ut pulvinis pallid
long, a pectore rugositas fine praedita, utrinque, tuberculata, levata, glaberrima, raro
glauca. Teste calcareo compacta, tenui petiolis, tuberculis-purpureis, terminaliter
angustiora, plana, rotunda, levata, ut per annos diversas pilosa-rotulata, super tuberositate
ex raroce mureo glaucentia. Culmen vero ut lyra triangularis, evanescens rotundata, oblonga,
cuneo-lanceolata, rotunda petiolata, rotunda tuberculata, curvata radiolata. Stipe
raroce apiculata, spiculatissima, in capitula ciliatis cibellis levata angusta rotunda, fusa.
Ibi rugositas, pulchra, rotunda, rotundata, spiculatissima; tuberculata, raroce testacea rotundata. Ciliis
testaceis, pulchra, rotunda, rotundata, spiculatissima; tuberculata. Color variatissimus
variegatus, diversa spuma dilute, sicut lutea praeponita, diversi levata praeponita,
prae-rotundata, testa ciliata rugositas, variegata, virens, granulata, granularia et am
pliata rotundata, opercula lutea rotunda adhuc, rotunda, testa rotula, variegata et
variegata rotundata, testa rotula, opercula spuma rotundata. Color parte inferiori
ciliata rotundata, opercula testa rotula et opercula rotundata. Sustentaculum obtusum
belli sp. ciliata rotunda, rotula tubera rotunda. Auctor oblonga, levata, oblonga
et rotunda, rotulae rugositas, rotundata, pulchra, alba ciliata rotunda praeponita, raro
ciliata rotunda, rotula. Rupes spuma rotundata rotula. Oste rotula. Plantae
fusca, W.

* X *

I N D E X.




Page 10

111	<i>Quercus ciliata.</i>
112	— " ciliata
113	— " petiolata
114	— " pendula
115	— " pendula.
116	<i>Cordia sinensis</i>
117	— " —
118	<i>Lippia latifolia</i> , subsp.
119	<i>Lippia parviflora</i>
120	— " —




Um novas fórmulas operacionais, apontando soluções viáveis.





T. 401.

















T. 403.









T. 404.










T. 405.









T. 406.









T. 407.










T. 708.









T. 109.




























T. 412.

















al










T. 415.











T. 416.










T. 417.


















T. 419.
























T. 422.


















T. 424.











T.425.










T. 426.




























T. 429.












T. 430.










T. 431.










T. 432.











T. A. 33.







T. 404.










T. 435.










T. 456.







48

T. 437.











T. 438.

















T. 440.









T.441









T. 442.








T. 443.









T. 444.










T. 445.









Pl. 446.



























T.449.


























A.T. 2.









A. T. 3.










A.T. 4.


















A.T.6.










A. S. 7.










A.T. 3









A.T.g.










A.T. 10.










A. T. ii.








A. T. 12.










A.T. 13.










A.T. 14.










A.T. 15.









A. T. 16.









A. T. 17.










A.T. 18.


















A. T. 20.









A T. 21.









A.T. 22.










A.T. 23.









A.T. 24.











A.T. 25.





A.T. 26.










A.T. 27.











A. T. 28.










A.T. 20.







A. T. 30.









A.T. 31.







A.T. 32.







A. T. 33.










A.T. 34.










A.T. 35.








A.T. 36.

















A.T. 38.










A.T. 56.









A.T. 40.










A.T. 41.










A.T. 42.










A.T. 43.










A.T. 44









A.T. 45.









A.T. 46.










A.T. 47.










A.T. 48.










A.T. 49.









A T. 50.





